



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة كربلاء
كلية الإدارة والاقتصاد
قسم الإحصاء

استعمال بعض الأساليب الإحصائية لدراسة تأثير الشاي الأخضر لتقليل الإجهاد الملحي في نبات الخيار

رسالة مقدمة إلى

مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الإحصاء

تقدمت بها

مروه حيدر غازي

المشرف

د.وسن مضر أبو التمن

بإشراف

أ.د. عواد الخالدي

2018 م

1439 هـ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

تَسْبِيحُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة البقرة

الآية ﴿255﴾



الإمام عليه السلام

إلى سيدة النساء وبضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . . . إلى أم أبيها الطاهرة المطهرة

فاطمة الزهراء

إلى التي لا زمني دعائها باستمرار . . . فتزاني أحيا وأوصل المشوار

أمي الحنون

إلى الذي أرى في عينه الدفء . . . ومن تضحياته تعلمت الوقوف بوجه الإعصار

أبي العزيز

إلى الذين سبهم تظل علي باستمرار . . . كأنهم ورودا وأشجار

أهلي

إلى الذين أرى علمهم وسط الليل نهار

أساتذتي الأعزاء

إلى الروح التي سكنت روحي

أنبي

إلى من أحببت

مؤلا





شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين, أنوار الهدى وأعلام الدين
وبعد :

يسرني في البدء أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى الدكتور الفاضل (عواد الخالدي) الذي قام بالإشراف على هذا
البحث بحسن توجيهاته وإرشاداته القيمة وملاحظاته الرصينة.

وأتقدم بالشكر والامتنان إلى الدكتورة الفاضلة (وسن مضر) التي أشرفت على سير التجربة .

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى عائلة قسم الإحصاء أساتذتي الكرام لما قدموه لي من علم ومعرفة طوال مدة دراستي
الأولية والعليا كما أشكر زملائي في الدراسة الأعزاء.

ويسرني إن أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذين الفاضلين " الخبير اللغوي " و " العلمي " لتفضلهم بقبول تدقيق
الأطروحة جزاهما الله خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة متمنية أن تنال
استحسانهم ورضاهم.

واختتم شكري وتقديري للذين أسهموا في توفير الدعم المادي والمعنوي لي طوال مدة الدراسة والدي ووالدي
وأهلي الذين تحملوا أعباء الدراسة وصعوبتها أقدم جهدي هذا لتقرّبة عيونهم.



قائمة المحتويات

المحتوى	رقم الصفحة
الآية	A
الإهداء	B
شكر وتقدير	C
المستخلص	D
قائمة المحتويات	E-F
قائمة الجداول	G
قائمة الأشكال	H
الفصل الأول : منهجية البحث	
1-1 □ قذبة	1
2-1 □ شكلية الدراسة	3
3-1 هدف الدراسة	3
4-1 حدود الدراسة	3
5-1 أهمية الدراسة	3
6-1 الاستعراض المرجعي	8-4
الفصل الثاني : الجانب النظري	
1-2 □ قذبة	9
2-2 الإنبات	9
3-2 الإجهاد الملحي فسيولوجيا الإجهاد	9
4-2 المصطلحات الأساسية في تصميم التجارب	11
5-2 التجربة البسيطة	12
6-2 التجارب العاللية	12
1-6-2 دواعي استعمال التجارب العاللية	13
2-6-2 فوائد التجارب العاللية	13
3-6-2 عيوب التجربة العاللية	14
4-6-2 التأثير الرئيس للعالل	14
5-6-2 التأثير البسيط للعالل	14
6-6-2 التفاعل	14
7-6-2 □ دلول التفاعل	14
7-2 التصميم العشوائي الكال CRD	15
8-2 النموذج الرياضي لتصميم CRD	15

17	□ جلابع المربعات	9-2
19	تحليل الاتجاهات	10-2
20	تحليل الانحدار	11-2
21	الانحدار الخطي البسيط	1-11-2
22	الانحدار الخطي المتعدد	2-11-2
23	النموذج الخطي العام خلال نقطة الأصل	3-11-2
23	المقارنات المتعددة	12-2
24	المقارنات المتعددة	13-2
25	اختبار اقل فرق □ عنوي Lsd	14-2
51-27	الفصل الثالث : الجانب العملي	
27	□ قذبة	1-3
28	وصف التجربة	2-3
28	وصف البيانات	3-3
29	الأساليب الإحصائية المستعملة	4-3
30	اختبار التوزيع الطبيعي	5-3
31	تحليل البيانات	6-3
36	اختبار الفروق المطلقة	7-3
41	تقدير تأثيرات العوامل في الاستجابة	8-3
43	تقدير تأثير □ حلول الشاي الأخضر بنسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار	1-8-3
44	تقدير تأثير المدد الزني □ نية للتنقيح بنسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار	2-8-3
45	تقدير تأثير تراكيز الملح بنسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار	3-8-3
54-52	الفصل الرابع : الاستنتاجات و التوصيات	
52	الاستنتاجات	1-4
54	التوصيات	2-4
	المصادر	
	الملحق (1) نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار لتحليل التجربة العمالية	
	الملحق (2) نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار خاص بتحليل الانحدار	
	المستخلص باللغة الانجليزية (Abstract)	

قائمة الجداول

الجدول	عنوان الجدول	رقم الصفحة
1	تحليل التباين للتجارب العاملية وفق تصميم CRD	18
2	تحليل تباين الانحدار للمعلومات المقدره	22
3	التوزيع الطبيعي للبيانات	30
4	تحليل التباين لبيانات الكلوروفيل في الورقة	32
5	تحليل التباين لبيانات الكلوروفيل في الورقة بعد حذف B4	33
6	تحليل بيانات الكلوروفيل للعوامل الداخلة في التجربة بعد حذف معالجة السيطرة من المدة الزمنية والتراكيز الملحية	34
7	الفروق المطلقة بين متوسطات مستويات الشاي الأخضر	36
8	الفروق المطلقة بين متوسطات المدة الزمنية للتنقيح	37
9	الفروق المطلقة بين متوسطات التراكيز الملحية	38
10	الفروق المطلقة لمتوسطات تفاعل الشاي الأخضر مع المدة الزمنية للتنقيح	39
11	الفروق المطلقة لمتوسطات تفاعل مستوى الشاي الأخضر مع التراكيز الملحية	40
12	الفروق المطلقة لمتوسطات تفاعل المدة الزمنية للتنقيح مع التراكيز الملحية	41
13	تحليل تباين الانحدار للعوامل الثلاثة الداخلة في التجربة (x_3, x_2, x_1) مع y	42
14	تحليل تباين الانحدار (x_1, y)	43
15	تحليل تباين الانحدار (x_2, y)	44
16	تحليل تباين الانحدار (x_3, y)	45
17	تحليل التباين للمتغيرين X_2, X_3	46



قائمة الأشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	الشكل
30	الرسم الطبيعي للبيانات	1
47	رسوم بيانات الكلوروفيل للعوامل مع مستوياتها (a) الشاي الأخضر (b) المدة الزمنية للتنبيع و (c) تراكيز الملح	2
47	رسوم متوسطات بيانات الكلوروفيل للعوامل والمستويات (a, b ,c)	3
48	تأثير كلٍ من المدة الزمنية وتركيز الملح في مستويات الشاي الأخضر	4
48	المدة الزمنية للتنبيع في المستوى الأول للشاي الأخضر	5
49	المدة الزمنية للتنبيع في المستوى الثاني للشاي الأخضر	6
49	المدة الزمنية للتنبيع في المستوى الثالث للشاي الأخضر	7
50	التراكيز الملحية في المستوى الأول للشاي الأخضر	8
50	التراكيز الملحية في المستوى الثاني للشاي الأخضر	9
51	التراكيز الملحية في المستوى الثالث للشاي الأخضر	10

المستخلص

تؤدي التجارب الزراعية دورا رئيسا للعاملين في المجال الزراعي من حيث التجريب والتحليل من أجل الوصول إلى أهم العوامل المؤثرة على إنتاجية النباتات.

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير مستخلص الشاي الأخضر في إنتاج الخيار عن طريق زرع بذور الخيار لفترات مختلفة من الزمن في تركيبات ملحية مختلفة وتركيزات مختلفة من محلول الشاي الأخضر قبل الإنبات.

وقد أجريت التجربة وفقا للتصميم الكامل العشوائية لتجربة عاملية كاملة (5 * 4 * 3 * 3).

نظريا، تمت دراسة التجارب المختبرية بالكامل في إطار التصميم التام التعشييه والطرق الإحصائية المستخدمة في الدراسة إذ استخدمت التجربة العاملية وتحليل الاتجاهات وتحليل الانحدار .

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تسجيل البيانات من خلال التجارب التي أجريت في جامعة بابل- كلية العلوم في قسم علوم الحياة لتجارب علمية في ظروف مختبرية تتكون من ثلاثة عوامل. وكان العامل الأول هو الشاي الأخضر يحتوي على ثلاث مستويات (0.1، 0.01، 0.001) غرام. والثاني هو طول الوقت لحظي (تنقيع) البذور في مستخلص الشاي الأخضر ولديه أربع مستويات (0، 6، 12، 24) ساعة و الثالث تركيز الملح في خمس مستويات (0، 1.5، 2.5، 3.5، 4.5) dsm/m

بعد اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات، تم تحليل التباين وتم حساب التأثيرات الرئيسية للعوامل. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستخلص الشاي الأخضر كان له تأثير معنوي في تركيز الكلوروفيل في أوراق الخيار. كان أفضل مستوى من الشاي هو المستوى الثاني (0.01) الذي أعطى أفضل استجابة، وأظهرت المدة الثالثة من الوقت (12) ساعة أفضل تأثير في الاستجابة. وكان تركيز الملوحة الرابع (4.5) dsm/m هو أفضل تأثير في نسبة الكلوروفيل في ورقة الخيار.

استنادا إلى النتائج التي تم الحصول عليها من جدول تحليل التباين، تم تقدير العلاقة بين المعالجات والاستجابة. أظهرت المعادلات الخطية لتقدير العلاقة بين العوامل الفردية على أن دقة تمثيل المعادلة الخطية ليست مناسبة لتقدير العلاقة بين كل عامل على حدا والاستجابة.

كانت المعادلة الخطية، التي تفترض أن الثابت يساوي صفر، هي الأفضل لتمثيل هذه العلاقات. كان للمعادلة المقطرة للعلاقة بين الأملاح والكلوروفيل أعلى معامل تحديد، ومن ثم المدة الزمنية للتنقيع ثم تركيز الشاي الأخضر.

لم نتمكن من حساب أفضل تركيز للأملاح لأن المقارنة التريبيعية للأملاح لم تكن معنوية.



الفصل الأول

منهجية الرسالة



الفصل الأول

منهجية الرسالة

Introduction

(1-1) المقدمة

في ضوء حركة التطور والتقدم العلمي المعتمد على إجراء التجارب المصممة في إحدى المجالات المراد دراستها , انبثقت فكرة البحث والتطبيق في مجال الزراعة " علم تصميم التجارب هو العلم الذي يعد احد فروع علم الإحصاء" , ولقد ساهم العمل في محطات التجارب بإيجاد واستحداث العديد من التصميمات واستعمال الأساليب الإحصائية الملائمة بتخطيط واستغلال الإمكانيات المتاحة بحيث تمكنه من وضع انسب التصاميم والخطط لجمع البيانات وبناء أفضل أنموذج انحدار لها وتحليلها حيث أن هذه البيانات يتم الحصول عليها من التجارب الزراعية وفق أسس علمية رصينة _عموما_ من أكثر طرق البحث دقة؛ فهي تعد دراسة اختباريه يتم فيها تحصيل المعلومات والجديد من الحقائق عن طريق الملاحظة وجمع البيانات ثم تحليلها وتفسيرها، ويوجد هناك أنواع متعددة ومختلفة من التجارب الإحصائية، لعل من أبرزها: التجارب العاملية، إذ توجد عدة تصاميم تنفذ عن طريقها التجارب العاملية منها تصميم تام التعشية (Completely Randomized Design) وتصميم القطاعات الكاملة العشوائية (Completely Randomized Blocks Design).... الخ , إن من ابرز مميزات التجربة العاملية أنها تتيح للباحث تجربة أكثر من عامل في الوقت نفسه لتقليل الجهد والكلفة ولقد ساهم علم الإحصاء و الإحصائيون في تقدم البحث العلمي عن طريق إيجاد العديد من تصاميم التجارب الإحصائية، و الأساليب التحليلية الملائمة لها. هناك الكثير من المشاكل التطبيقية التي تواجه الباحثين الإحصائيين في انجاز بحثه العلمي أو الدراسة أو التجربة التي يقومون بها . و من أهم هذه المشاكل هو مدى توفر البيانات ففي الدراسات الزراعية مثلا يصعب الحصول على البيانات أو نتائج التجربة الميدانية الزراعية عن المحاصيل الزراعية (عينة البحث) للدراسة .

ومن أجل توضيح فصول الرسالة وهيكلتها تم تقسيمه إلى أربعة فصول .:

الفصل الأول : تضمن هذا الفصل منهجية الرسالة و استعراض مرجعي للدراسات السابقة المتعلقة بالجوانب الآتية : تصميم التجارب , تحليل الاتجاهات و تحليل الانحدار

تناول الفصل الثاني الفرضيات الخاصة بالتجارب التي تقام لهذا الغرض , واختيار أسلوب التحليل الإحصائي الملائم مع الاختبارات اللازمة لمطابقة النماذج الإحصائية المقدره مع النماذج النظرية

إما الفصل الثالث الجانب العملي , التجربة أالمختبريه الفعلية التي قمنا بها تتمثل باختيار نوع من أنواع النبات وهو بذور الخيار والمؤثرات عليه من ملوحة أو مدة حضي (تنقيع) حسب أوقات مختلفة واختيار نوع التصميم الملائم ودراسته من الناحية النظرية ومدى مطابقته النتائج النظرية للوصول إلى النتائج المهمة .

و الفصل الأخير تم استعراض أهم الاستنتاجات التي تم توصلت إليها الباحثة ووضع المقترحات اعتمادا على أهم لاستنتاجات

The Problem of the Research

(2-1) مشكلة الرسالة

بالنظر لدراسة تأثير عامل محلول الشاي الأخضر على تقليل الإجهاد الملحي في نبات الخيار يتعدى حسابه أو تحليله باستخدام التجارب البسيطة فقد تم في هذه الرسالة استخدام تحليل التجارب العاملية لدراسة تأثير عدة عوامل في أن واحد .

The Aim of the Research

(3-1) هدف الرسالة

تهدف هذه الرسالة إلى استعمال التجارب العاملية (5*4*3) لدراسة تخفيف التأثيرات الضارة للملوحة في النباتات الحساسة للملوحة عن طريق الحض (تنقيع) المسبق لبذور نبات الخيار في مستخلص الشاي الأخضر .

(4-1) حدود الرسالة

أجريت التجربة مختبريا في مختبرات كلية العلوم / قسم علوم الحياة / جامعة بابل للمدة من 2017\10\20 - 2017\11\1 علما أن فترة الإنبات في نبات الخيار مدتها القياسية 10 أيام

The Importance of Studying

(5-1) أهمية الرسالة

تستمد الرسالة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه وتبحث فيه لارتباط هذا الموضوع بحياة الأفراد بشكل مباشر فضلا عن أن الرسالة تركز على تقدير حدود التراكيز الملحية التي تسمح بزراعة الخيار, و أن ذلك لا يمنع من إعمام أسلوب المعالجة على نباتات أخرى وتحديد المساحات الزراعية في العراق التي تختص بزراعة نبات محدد أو عدة نباتات ترتبط بشكل مباشر بالغذاء ذلك إن أزرعه من أهم القطاعات الاقتصادية التي تشكل الناتج القومي وعليها يعتمد أيضا القرار السياسي فضلا عن القرار التخطيطي .

تم وضع الأسس للمفاهيم والقواعد الخاصة بتصميم التجارب وتحليلها عام (1925)، باستثناء التجارب العاملية والتي تسمى بالتجارب المعقدة (Complex experiment)، إذ قام العالم (Fisher) عام (1926) بتصنيفها كتجربة عاملية ومن بعده اتبع (Yates) التسمية نفسها. وبالرغم من أن العالم (Fisher) له الفضل الأساس في تطوير التجارب العاملية وتحليلها ولكن يعد (Yates) صاحب الفضل في تعزيز تطوير تحليل التجارب العاملية.^[1]

وفي عام (1937) استعمل (Yates) طريقة التحليل الإحصائي للتجارب العاملية من النوع 2^n و 3^n بشكل معمق وشامل ووضع طرائق التحليل الإحصائي ولكن بدت تلك الطرائق صعبة وتزداد صعوبة وتعقيداً عندما تزداد عدد العوامل الداخلة في التجربة.^[34]

وفي عام (1944) استعمل (Lie) الطرائق نفسها التي استعملها (Yates) لتكوين تصاميم التجارب التي تتضمن عدة مستويات من الدرجة k ^[21].

وفي عام (1956) قام كل من (Wilk and Kempthorne) بصياغة الأنموذج الخطي للتصميم التام التعشبية (CRD) في التجارب العاملية وكتب الأنموذج بالصيغة الآتية:

$$(Y_{ijk} = \mu + a_i + b_j + \dots e_{ijk})$$

$$I=1,2,\dots,n \quad j=1,2,\dots,m \quad k=1,2,\dots,r$$

وتم تطوير أساليب تحليل الأنموذج حتى عدُّ احد الأنموذجات التي تحقق خاصية الأنموذج الإحصائي الخطي وقد أطلق عليه تسمية (أنموذج التجربة المخصص)^[32].

وفي عام (1967) استعمل العالم (Rayner) طريقة (Yate's Algorithm) لحساب مجاميع التأثيرات الرئيسية للعوامل الداخلة في التجربة وتفاعلاتها في التجارب العاملة 2^n ذات المستويات المتساوية المسافة [27].

وفي عام (1971) قام العالم (Searle) بتقسيم التباين إلى العوامل الداخلة في التجربة وأن هذه العوامل تتكون من مستويات متعددة ووصف البيانات في معلمات الأنموذج الخطي التي يمكن إن تقدر بأساليب متعددة و واحدة من هذه الأساليب هي تقديرات المربعات الصغرى التي تستعمل عادة في جدول تحليل التباين ANOVA [29].

وفي عام (1971) ايضاً قام كل من الباحثين (Saha and Das) بنشر تقرير تضمن أول محاولة لبناء تصميم قطاعات ناقصة ومتوازية جزئياً وتم التطبيق على عدة تجارب عاملية لعاملين أو أكثر متساوية في المستويات (كل عامل يحتوي على مستويين) وتم الوصول إلى عدة تصاميم مقترحة ونُشرت على شكل أبحاث [28].

وفي عام (1981) استعمل كل من (Draper and Smith) موضوع تصميم التجارب العاملة وطرائق تحليلها بواسطة مصفوفات المعاملات متعددة الحدود المتعامدة، ومعرفة نوع تأثير المستويات الجزئية للعوامل، وهل هي ذات تأثير خطي (linearity) أو تربيعي (quadratic) أو تكعيبي (cubical) أو غيرها من التأثيرات، وتم وضع المصفوفات الخاصة بمعاملات المركبات المتعامدة لذلك النوع من التحليل وفق عدد مستويات العوامل الداخلة في التجربة [19].

وفي عام (1984) قام كل من (Dean and Lewis) بتقديم بحثاً تناول دراسة مقارنة لأعلى حد من التأثير يصله العامل الداخل في التجربة حسب تصميم القطاعات الكاملة العشوائية وقاما بمقارنة أربعة حدود عليا من التأثير لعوامل كفوّه حسب تصميم القطاعات الكاملة العشوائية مع مراعاة التكرارات وتساوي أحجام القطاعات في كل مكرر وقد نجح واحد فقط من هذه الحدود الأربعة [17].

وفي عام (1993) قام (Brzeskwiniewicz) بدراسة موضوع تحليل التباين , واستعمل تحليل التباين للتجربة المنجزة عملياً بتصميم القطاعات الجزئية الموزونة ضمن التجارب العاملة باستعمال جدول تحليل التباين (ANOVA), وذكر إن تصميم القطاعات الجزئية الموزونة تؤدي دوراً كبيراً ومهماً في التجارب العاملة [15].

وفي عام (1995) قام العالم (kirk) بتفسير التجربة العاملة وكيفية تحديد التأثيرات الرئيسية وتفاعلاتها في التجربة إذ قام بالجمع بين مستوى من مستويات العامل مع كل مستوى من العامل الأخر الداخل معه في التجربة [20].

وفي عام (2004) قام (Oyeyemi) ببناء نموذج للتعامل مع البيانات الغير طبيعية باستعمال B-technique و Box-cox أو باستعمال GLM ومقارنة الرسوم البيانية للاستجابات المقدره عن طريق طول مدة الثقة لمتوسط الاستجابة في تصميم التجربة الصناعية [25].

وفي عام (2005) قام كل من (Dossou and Tinsson) بدراسة تصاميم تجريبية وتكييفها للأنموذج الخطي العام, ووضحا طريقة دالة الربط التعامدية من مصفوفة التصميم التي تم الحصول عليها تحت افتراض غاوس, وتم التحقيق من خصائصها باستعمال المحاكاة [18].

وفي عام (2006) قام كل من (الحمداني واخرون) بدراسة تجربة عاملية وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية (CRBD) وبثلاث مكررات (قطاعات) تضمنت هذه التجربة عاملين رئيسين لتأثير تركيز الاسماد الكيماويه لمسافة بين نبات وأخر في إنتاجية الباذنجان , وبعد تحليل التجربة توصلوا إلى تفوق التركيز الرابع من العامل الأول على التراكيز الأخرى وظهرت فروق معنوية للصفات المدروسة لنبات الباذنجان, بينما لم تظهر فروق معنوية بين مسافات الزراعة المستعملة في التجربة على الصفات المدروسة لذات النبات نفسه, واطهرت النتائج تحسن ملحوظ وزيادة إنتاجية لمحصول الباذنجان [4].

وفي عام (2009) قام كل من (Oyeyemi وآخرون) بتحليل التجربة العاملية التي تنطوي على العوامل النوعية والعوامل الكمية ، إذ إن هدف التحليل معرفة مدى فعالية التفاعل بين مستويات النوعين من العوامل وقوته وتأثيره في الاستجابة ومعرفة الاحتمالات المختلفة التي قد تنشأ عند التعامل مع العوامل النوعية والعوامل الكمية في التجربة العاملية [26].

وفي عام (2009) قام كل من (محمد و خلف) باقتراح عدة افتراضات تسهم في تسهيل دراسة تصميم التجارب وتحليلها ولاسيما التجارب التي تتطلب حسابات كثيرة لمجموع المربعات (Sum Square) ومنها التجارب العاملية 2^n وذات الإدماج الكلي بالاعتماد على صيغ وأساليب مفترضة لكيفية تثبيت إشارات معاملات المعالجات وكذلك حساب مجموع المربعات لكل مركبة عندما يتم تجزئة مجموع مربعات الخطأ (SSE) في التجارب العاملية [14].

وفي عام (2010) نشر (علوان وآخرون) بحثاً تضمن دور بعض المستخلصات النباتية في تزهير الخيار في البيوت البلاستيكية , إذ تم دراسة تأثير الرش بأربعة مستخلصات نباتية مختلفة وهي (الحلبة , جذور عرق السوس , القريص والثوم) , لتزهير هجينين من الخيار هما هجين لهلوبة والمختار, إذ نفذت التجربة في تصميم القطاعات المعشاة وبثلاث مكررات, وأظهرت النتائج تفوق الهجين لهلوبة على هجين المختار معنوياً, وتبين إن الرش بالمستخلصات على نباتات الخيار كان له تأثير معنوي, إذ تفوقت نباتات الخيار التي رشت بمستخلص الحلبة في حاجتها لأقل عدد من الأيام لتفتيح أول زهرة [13].

وفي عام (2011) قام (بدوب والعباي) بمقارنة بعض طرائق معالجة النقص في الوحدات التجريبية اللازمة لتطبيق التجارب العاملية (Factorial experiment), وذلك لان التجارب العاملية تحتاج إلى كثير من الوحدات التجريبية وللتغلب على النقص في الوحدات التجريبية تم استعمال ثلاثة تصاميم للقطاعات الناقصة المتزنة للتعرف على أفضلها, وتم تطبيقها على تجربة عاملية (2^3) وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية (CRBD) وبسبعة قطاعات (مكررات) عدت تجربة مقارنة و تم الوصول إلى تصميم القطاعات الناقصة المتزنة والإدماج الكامل والإدماج الجزئي [12].

وفي عام (2011) نشر كل من (الصحاف, وآخرون) بحثاً تضمن استجابة هجن الخيار إلى الأسمدة الكيميائية والعضوية إذ كان هدف البحث اختبار استجابة هذا الهجن إلى برامج الأسمدة الكيميائية والعضوية إذ تم استعمال برنامج تسميد كيميائي مقترح (T1) وبرنامج تسميد عضوي مقترح (T2) واستعمال التسميد الكيميائي الموصى به (T3) لمعرفة إمكانية تفوق البرامج المقترحة على البرنامج التسميدي الموصى به, وتم الوصول إلى إن معاملة التسميد الموصى به (T3) أفضل النتائج [7].

وفي عام (2012) قام الباحث (جعفر) بدراسة تجربة عاملية وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية (CRBD) واشتملت التجربة على عاملين مؤثرين في الصفة المدروسة لنبات الباذنجان المزروع تحت ظروف البيوت البلاستيكية, تمثل العامل الأول بعدد الرشاشات وبعده مستويات (رشة واحدة, رشتان, ثلاث رشاشات) وتمثل العامل الثاني بالسماذ البوتاسي, وبتراكيز مختلفة (0, 2, 4, 6) غم/لتر إذ نفذت التجربة بثلاث مكررات (قطاعات) وقد تم الوصول إلى أن هنالك فروقاً معنوية بين تراكيز السماذ البوتاسي وكذلك الحال أيضاً توجد فروق معنوية بين عدد الرشاشات المستعملة لرش نبات الباذنجان وتزداد تلك الفروق كلما ازداد تركيز السماذ المستعمل وعدد الرشاشات, كذلك هنالك فروق جوهرية للتفاعل بين مستويات العاملين المؤثرين إذ اتضح إن النباتات التي رشت ثلاث مرات وبتراكيز 6 غم/لتر من السماذ البوتاسي أعطت أفضل استجابات مقارنةً بالتفاعلات (المعالجات) العاملية الأخرى [10].

وفي عام (2013) قدم كل من (حملاً وآخرون) بحثاً بعنوان "تأثير ملوحة مياه الري ومغذيتها والنقع بحامض الاسكوربيك والمستخلص البحري (OLIGO-X) في إنبات ونمو بادرات بذور هجين الخيار DALIA الخاص بالزراعة المحمية", بهدف دراسة أثر كل من مغنطة المياه و ملوحتها ونقع البذور بكل من حامض الاسكوربيك, الماء المقطر والمستخلص البحري في سرعة إنبات البذور وبعض الصفات الخضرية للبادرات عند زراعة بذور الخيار صنف داليا الخاص بالبيوت المحمية, وتم الوصول إلى أن مغنطة مياه الري سببت زيادة معنوية في سرعة ونسبة إنبات البذور [11].

الفصل الثاني

المجانب النظري

الفصل الثاني

الجانب النظري

Introduction

(1-2) المقدمة

يسلط الضوء في هذا الفصل على الظاهرة المدروسة وتعريفها فضلاً عن معرفة الجوانب المتداولة في الظاهرة المدروسة كالتجربة العملية (تعريفها، أزمائها، عيوبها وما يتعلق بها) والتصميم المستعمل فيها، وكذلك توضيح تغير الاستجابة ومدى اقترابه من التوزيع الطبيعي، وعرض الأساليب الإحصائية المستعملة بتحليل التجربة الكلاسيكية العشوائية وتثبيت المعادلات والأنموذجات والجداول الإحصائية وتوضيح الرمز المستعمل في التجارب العملية وتصميماتها.

Germination

(2-2) الإنبات

يعد الإنبات المرحلة الأولى من عمر النبات تكون فيها البذور شديدة الحساسية وغير حصنة ضد الاجهادات الملحية لذا فإن من الضروري معالجة هذه المشكلة لاسيما وأن اغلب الترب العراقية تعاني من الملوحة وأصبحت غير صالحة للزراعة في بعض المناطق، فوجد إن حضي (تنقيع) البذور في بعض المركبات الكيماوية أو المستخلصات المائية النباتية أعطى نتيجة ايجابية وفاعله للتقليل من ضرر الاجهادات الملحية.

Salt Stress

(3-2) الإجهاد الملحي

تعد الملوحة من أهم المشاكل البيئية التي تواجه الزراعة، والتي تكونت نتيجة الري غير المنتظم وزيادة تبخر الماء وقلة سقوط الإطار أو انعدامها، عدم معالجة التربة من قبل فرق خاصة ما أدى إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة إلى أراضي بالحة، سلطة بذلك إجهاداً لحياتاً على النبات،

يعرف الإجهاد فيزيائياً على أنه القوة الميكانيكية المجهزة للجسم في وحدة المساحة، [22] أن الناحية البيولوجية فإنه يعرف على أنه القوة أو الظرف الذي يثبط الوظائف الطبيعية للكائنات الحية [22]، وقسمت النباتات من حيث قوتها للإجهاد الملحي إلى [22] تحمله للملوحة (Tolerant of salinity)، وفيها يطور النبات نوعين من الميكانيكيات أو الآليات الفسيولوجية للتغلب على الإجهاد، الأولى هي آلية تحمل الإجهاد والتي تتحقق عن طريق التعديل الأيوني وتغيير رونة الأنسجة أو تحويل في [22] صائص الأغشية الخلوية لتكون قادرة على [22] تصاص الأيونات ونقلها وإفراز الفائض منها [22] مارج الخلية، والثانية آلية تجنب الإجهاد والتي تبرز عن طريق تقليل فقدان الماء عن طرق غلق الثغور وتقليل النقل الثغري أو عن طريق تغيير شكل واتجاه الورقة. وثانيا الحساسية للملوحة (sensitive to salinity) التي لا تمتلك القدرة على تحمل الإجهاد [30].

والإجهاد نوعان [22] حيوي ويشمل (البكتريا، الحشرات والقوارض وغيرها) أو غير حيوي والذي بدوره يشمل (البرودة، الحرارة والرياح والجفاف والإشعاع والملوحة وغيرها)، ويعد الأيونات [22] أكثر الأنواع شيوعاً [22]، إذ أنه يسبب نوعين من الإجهاد هما الإجهاد الأيوني ionic stress والإجهاد الأيوني (osmotic stress) [31]، سببه بذلك:-

1- تلال التوازن الأيوني والذي يتمثل بدول أيونات الصوديوم التي تعرقل إمكانية الغشاء الخلوي التراكيز العالية من أيونات الصوديوم تسبب [22] تلالاً في التوازن الأيوني وعدم تنظيم وظيفة الغشاء الخلوي [22] تزال النمو وتنشيط اتساع الخلايا وانفسها وتساهل انتقال أيونات الكلور عكس اتجاه التركيز.

2- تعد أيونات الصوديوم سبباً لأبيض الخلايا وهي ذات تأثير [22] وذو لبعض الأنزيمات.

أن التراكيز المرتفعة من أيونات الصوديوم تسبب [22] تزال في عملية البناء الضوئي وتوليد كميات كبيرة من الجذور الحرة، لذا يكون تأثيره بارزاً في النمو الخضري للنبات [22][30].

الخيار (*Cucumis sativus* L.) من المحاصيل الغذائية المهمة ينتمي إلى العائلة القرعية Cucurbitaceae وهو من النباتات الحساسة للملوحة [30].

أجريت العديد من المحاولات لتخفيف الضرر الذي يسببه الإجهاد الملحي بواسطة حض (تنقيح) بذور النباتات في مستخلصات الأعشاب الطبية أو بعض المواد الكيماوية.

أن الهدف من الدراسة الحالية هو لإيجاد طرائق فعالة وذات كلفة قليلة للتخفيف من التأثيرات الضارة للملوحة على النباتات الحساسة للملوحة عن طريق الحض (التنقيح) المسبق لبذور نبات الخيار بمستخلصات الأعشاب الطبية. إذ استعمل في هذه الرسالة مستخلص الشاي الأخضر لهذا الغرض.

يحتوي الشاي الأخضر (theaceae) camellia sinensis على العديد من المركبات الفعالة مثل الفينولات والمركبات المضادة للأكسدة , ووجد العديد من الفوائد لهذه المركبات فهي تشجع تحطم الدهون lipolysis وتعمل كحمايات ضد مسببات الأمراض مثل الحشرات والبكتيريا والفطريات والفيروسات

(4-2) المصطلحات الأساسية في تصميم التجارب [1][2][5][9]

Basic Terminology in the Design of Experiments

1- التجربة (experiment) : هي الطرائق العلمية التي تستند إلى الخطط المرسومة لها سابقا على أساس جيد وتبين لغرض الحصول على المعلومات أو الحقائق وتبار الفرضيات واكتشاف العلاقات الجديدة بين المتغيرات .

2- المعالجة (Treatment) : هي مجموعة الظروف التي توضع تحت سيطرة الباحث أو (هي المؤثرات المراد قياس تأثيرها على صفات عينة لمواد التجربة مع تثبيت العوامل الأخرى)

3- الوحدة التجريبية (Experimental unit): تعرف بأنها الوحدة من المادة التجريبية التي سيجري عليها تطبيق معالجة واحدة

3-التعشيرية (Randomization) : يقصد بها توزيع الوحدات المعالجات بصورة عشوائية على القطع التجريبية دون أي تدخل شخصي , وان يكون لكل وحدة تجريبية الفرصة نفسها في الحصول على أية معالجة كأي وحدة تجريبية أخرى .

4-التصميم (Design): هو التخطيط البحثي لإجراء تجربة عينة للحصول على بيانات يمكن تحليلها والتوصل إلى استنتاج معين .

5- **الخطأ التجريبي (Experimental error)** : هو قياس للـتلافات الطبيعية التي سجلت عادةً من وحدات تجريبية عولت بالمعالجة لنفسها, بمعنى أن هو عبارة عن التباين بين وحدتين تجريبيتين أذت بالمعالجة (المعالجة) نفسها .

6- **العامل (factor)** : عبارة عن تغيير يهدف الشخص الباحث في قياس تأثيره في الصفة المدروسة ويكون لكل عامل عدة مستويات (قد يتشابه العامل مع مفهوم المعالجة لكنه أوسع منها إذ يضم العامل عدد من المعالجات).

7- **التكرار (replication)** : من أساسيات تصميم التجارب هو تكرار المعالجة في التجربة أكثر من مرة بمعنى أن يخصص للمعالجة أكثر من قطعة تجريبية ويتم تطبيقها بشكل مستقل.

تلخص أهمية التكرار فيما يأتي :

- إمكانية القياس الدقيق لتأثير المعالجات
 - كفاية التجربة وذلك بتقليل مقدار الخطأ التجريبي .
 - كلما زادت عدد التكرارات فإن التجربة تكون أكثر دقة .
- ويتضمن وضع تصميم التجارب أنواع كثيرة منها .

Simple Experiment

(5-2) التجربة البسيطة [9][5][2]

هي التجربة التي يدرس بها عامل (factor) واحد لمعرفة تأثيره على صفة عينة (تأثير عامل واحد فقط في الصفة المدروسة) ويجب ان تكون جميع المستلزمات للتجربة ثابتة وتجانسة ويكون عدد الوحدات التجريبية فيها

$$n=r \times t$$

إذ : n : عدد الوحدات التجريبية

r : عدد المكررات في التجربة

t : عدد المعالجات

Factorial Experiment

(6-2) التجربة العاملية [9][5][2][1]

التجربة العاملية : هي تجريبه يدرس فيها تأثير عاملين أو أكثر على صفة عينة وتأثير التداخل الموجود بين هذه العوامل وتكون فيها المعالجات عبارة عن مجموعة توافق بين

عدة مستويات لعدة عوامل فهي إذن تختلف عن التصلييم الأري لكنها تتميز بنوعية المعالجات المدققة في التجربة ,تطبق هذه المعالجات في إيـن التصلييم تام التعشبية وتصميم القطاعات الكلاكلة العشوائية والمربع اللاتيني ويمكن استعمال التصميم ثل التصميم الكلاكل العشوائية لأجراء التجارب العاللية حين يكون ان الممكن عمل توليفة ان العوالل المختلفة كماللة واحدة يجري تنفيذها بالأسلوب نفسه وتكون الدقة المطلوبة لقياس التأثير لكلا العوالل تساوية .فالتجربة ذات العوالل (A وله a ان المستويات و B وله b ان المستويات و C وله c ان المستويات) والتي تكرر r ان المرات يكون عدد وحداتها التجريبية هو $n = r \times a \times b \times c$

إذ n : عدد الوحدات التجريبية

a: عدد مستويات العالل الأول A

b: عدد مستويات العالل الثاني B

c: عدد مستويات العالل الثالث C وهناك دواعي لاستعمال هذه التجارب .

(1-6-2) واعي استعمال التجارب العاملية [1]

تستعمل التجارب العاللية في جالات البحث العلمي الذي يهدف إلى الحصول على نتائج تطبق في مستوى واسع النطاق وكذلك عند دراسة ظاهرة حددة إذ لا يمكن معرفة إي العوالل أكثر تأثيرا في الصفات المدروسة وبالتالي يكون الغرض ان التجربة قياس تأثير جميع المستويات للعوالل والتفاعلات بينها لإبراز أي التوليفات لها الأثر الكبير في الصفات تحت الدراسة .

(2-6-2) فوائد التجارب العاملية [1][2][5] Advantages of Factorial

Experiment

تمتاز التجارب العاللية بأنها

- 1- ذات كفاءة عالية لان كل قراءة تمدنا بمعلومات عن كل العوالل المدروسة والتأثيرات الرئيسية والتفاعل .
- 2- تقليل التكلفة و الوقت عندا تكون العوالل مستقلة ، أي ليست بينها تفاعل ، تقدر تأثيرات العوالل بدرجة عالية ان الدقة كما لو أجريت كل التجربة لعالل واحد.
- 3- اكتشاف التفاعلات وتقديراتها .

4- سهولة التحليل إذ لا يوجد إلا طاً تجريبي واحد.

على الرغم من الفوائد المذكورة لهذه التجارب لا تخلو من العيوب وأهمها

Shortages of Factorial Experiment [9][5][2][1] عيوب التجربة العاملية (3-6-2)

Experiment

1- كبر حجم التجربة بزيادة عدد العوامل لثلاثا لو كانت لدينا $3 \times 4 \times 4 = 48$ عالجة يزيد

من صعوبة التحليل

2- يصعب تفسير التفاعلات ذات الدرجات العليا مثل التفاعلات الثلاثية

Main Effects of the Factor [5][1][9] التأثير الرئيسي للعامل (4-6-2)

هو التغير أو الاختلاف في الاستجابة نتيجة لتغير مستوى العامل وتسمى التأثير

الرئيس لأنها تحظى بالاهتمام الأكبر في التجربة

Simple Effect of the Factor [5][1][9] التأثير البسيط للعامل (5-6-2)

Factor

هو الفرق في الاستجابة بين مستويين لعامل محدد عند مستوى معين لعامل آخر

interaction [5][1][9] التفاعل (6-6-2)

هو الاختلاف بالاستجابة نتيجة للتأثير المشترك للعاملين أو أكثر .

The Significance of the interaction [2][1] معنوية التفاعل (7-6-2)

إذا كان التفاعل عنوي فإن العوامل لا تكون مستقلة في تأثيرها عن بعضها ومن ثم فإن التأثيرات

البسيطة لعامل ما تتوقف على مستوى العامل أو العوامل الأخرى الدالة في التفاعل إذا كان

العكس أي أن التفاعل غير عنوي فإن العوامل الدالة في التجربة تكون مستقلة عن بعضها

وتكون تأثيرات عامل ما متساوية عند مستويات العوامل الأخرى .

والمواضيع التالية تستعرض أهم الأساليب الإحصائية المستعملة في التحليل

(7-2) التصميم الكلي العشوائية (CRD) Completely Randomized Design

[9][5][2][1][23]

التصميم الكلي العشوائية والذي يطلق عليه في بعض الأحيان تام التعشية إذ يعد من أبسط أنواع تصاميم التجارب البسيطة والأسهل من الناحية التطبيقية .
إذ أن زاياه هذا التصميم كالآتي :


- إن الوحدات التجريبية يجب إن تكون متجانسة تمامًا أو قريبة من التجانس .
 - المعالجات توزع على القطع التجريبية بطريقة عشوائية متساوية .
 - يمتلك التصميم رونة في استعمال إي عدد من المعالجات كما لا يشترط أن يكون التكرار متساويًا لكل معالجة .
 - يسمح هذا التصميم باستعمال درجات حرية عالية لمركبة دال المعالجات (الخطأ التجريبي) ون ثم فان قيمة التباين للخطأ التجريبي تتخفض .
 - إن فقدان نتائج إحدى القطع التجريبية أو بعضها لا يؤثر في سير التجربة .
- في حالة استعمال تصميم تام التعشية فإن المعالجات العشوائية يتم توزيعها عشوائيًا وبصورة متجانسة على القطع التجريبية بعد أن يتم تخصيص r من القطع التجريبية لكل معالجة , إذا كان العلاج A وله $a=3$ مستويات عددها والعلاج B الثاني B وله $b=3$ مستويات عددها والعلاج C وله $c=5$ مستويات عددها $c=5$ و صص لكل معالجة عليه r من القطع التجريبية فإن عدد الاستجابات في هذه التجربة العشوائية له $(3*3*4*5)$

(8-2) النموذج الرياضي للتصميم التام التعشية CRD [1][9][23]

The mathematical model of the Completely Randomized Design

لكل تصميم من تصاميم التجارب أنموذج يميزه عن تصميم آخر يعبر عن الاستجابة , وان الأنموذج الخاص بتصميم العشوائي الكلي للتجربة قيد الدراسة هو الآتي :

$$Y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + e_{ijkl} \dots (1)$$



إذ إن

Y_{ijkl} : تمثل قيمة الاستجابة للمشاهدة l في القطعة التجريبية الواقعة تحت تأثير المستوى i من العا l A والمستوى j من العا l B والمستوى k من العا l C .

μ : تأثير الوسط الحسابي العام .

التأثيرات الرئيسية

α_i : تأثير المستوى i من العا l A .

β_j : تأثير المستوى j من العا l B .

γ_k : تأثير المستوى k من العا l C .

تأثير التفاعل

$(\alpha\beta)_{ij}$: تأثير التفاعل بين المستوى i من العا l A والمستوى j من العا l B .

$(\alpha k)_{ik}$: تأثير التفاعل بين المستوى i من العا l A والمستوى k من العا l C .

$(\beta y)_{kj}$: تأثير التفاعل بين المستوى j من العا l B والمستوى k من العا l C .

$(\alpha\beta y)_{ijk}$: تأثير التفاعل بين المستويات (ABC) وكل حسب \square ستوياته .

e_{ijkl} : الخطأ العشوائي الخاص بالوحدة التجريبية (I) الواقعة تحت تأثير المستوى i من العامل A والمستوى j من العامل B والمستوى k من العامل C بافتراض انه يتوزع طبيعياً و مستقلاً بمتوسط يساوي صفر وتباين σ^2

$$e_{ijkl} \sim N(0, \sigma^2) \quad (2)$$

(9-2) مجاميع المربعات [1][2][5][9]

يتم حساب مجموع المربعات لجميع تركيبات التجربة العنصرية وفق التصميم الكامل العشوائية (CRD) وتطبيقاً على تجربة الدراسة من النوع (a,b,c,r) تحسب جميع المربعات حسب الصيغ الآتية :

$$\text{correct factor} = CF = \frac{\sum(y \dots)^2}{abcr} \quad (3)$$

$$SSA = \frac{\sum(y_i \dots)^2}{bcr} - CF \quad (4)$$

$$SSB = \frac{\sum(y_{.j.})^2}{acr} - CF \quad (5)$$

$$SSc = \frac{\sum(y_{..k})^2}{abr} - CF \quad (6)$$

$$SSAB = \frac{\sum(y_{ij.})^2}{cr} - SSA - SSB - CF \quad (7)$$

$$SSAC = \frac{\sum(y_{i.k})^2}{br} - SSA - SSC - CF \quad (8)$$

$$SSBC = \frac{\sum(y_{.jk})^2}{ar} - SSB - SSC - CF \quad (9)$$

$$SS_{ABC} = \frac{\sum (y_{ijk})^2}{r} - SSA - SSB - SSC - AB - AC - BC - CF \quad (10)$$

$$SST_{Total} = \sum (y_{ijkl})^2 - CF \quad (11)$$

$$SS_{Error} = SST_{Total} - SS_{ABC} \quad (12)$$

ونها نحصل على جدول تحليل التباين تحت حالة استويات العوامل الثلاثة ثابتة

$$\sum \alpha_i = \sum \beta_j = \sum \gamma_k = 0 \quad \text{كما في الجدول (1)}$$

جدول (1) تحليل التباين للتجارب العاملية (R*A*B*C) وفق تصميم CRD^[9]

S.O.V	d.f	S.S	M.S	F
Treatment	abc-1	SS _{treat}	$\frac{SST}{abc-1}$	$\frac{MStreat}{MSE}$
A	a-1	SSA	$\frac{SSA}{a-1}$	$\frac{MSA}{MSE}$
B	b-1	SSB	$\frac{SSB}{b-1}$	$\frac{MSB}{MSE}$
C	c-1	SSC	$\frac{SSC}{c-1}$	$\frac{MSc}{MSE}$
AB	(b-1)(a-1)	SSAB	$\frac{SSAB}{(b-1)(a-1)}$	$\frac{MSAB}{MSE}$
AC	(c-1)(a-1)	SSAC	$\frac{SSAC}{(c-1)(a-1)}$	$\frac{MSAc}{MSE}$
BC	(c-1)(b-1)	SSBC	$\frac{SSBC}{(c-1)(b-1)}$	$\frac{MSbc}{MSE}$
ABC	(c-1)(b-1)(a-1)	SSABC	$\frac{SSABC}{(c-1)(b-1)(a-1)}$	$\frac{MSABc}{MSE}$
Error	(ab)(c-1)(r-1)	SSE	$\frac{SSE}{(ab)(c-1)(r-1)}$	
Total	rabr-1	SSTO		

والأسلوب الإحصائي الثاني هو تحليل الاتجاهات كما في التالي .

اقترح تحليل الاتجاهات من قبل Cochran & Cox (1957) [18] و يعد موضوع تحليل الاتجاهات موضوعاً كماً لعملية تحليل التباين في حالة العوازل الكمية ويعتمد على اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لوصف العلاقة بين المتغير التفسيري والمتغير التابع (تغير الاستجابة) وتحديد درجة هذه العلاقة هل تتبع هذه العلاقة المعادلة من الدرجة الأولى (First degree) أو معادلة من الدرجة الثانية (تربيعي) أو معادلة من الدرجة الثالثة (تكعيبي) أو معادلة من الدرجة الرابعة (Quartic) الخ , وغالباً ما يكتفى بالدرجة الثالثة كحد أعلى وذلك لصعوبة تفسير الحد الأعلى وبصورة عالية يتم تحديد درجة المعادلة اعتماداً على عدد مستويات العازل إذ أن عدد المعادلات تساوي عدد مستويات العازل ناقص واحد ، واستعمل عام (1971) Myers [24] هذه الطريقة في تحديد عدد معادلات الانحدار واستعملها أيضاً كلاً من المشهداني [8] و الراوي [5] .

إذ يمكن تقسيم جميع المربعات الخطية و التربيعية والتكعيبية للمعادلات إلى صايرها حتى الدرجة الرابعة الخ ، ويتم حساب مجموع المربعات لكل صاير باستخدام جدول عوازل معادلات خاصة به وكما يأتي [5] :

المعادلات الخاصة بالعازل B هي الآتي :

C عبارة عن تركيبة طيه (التقابلات المتعددة) بين المعالجات ويمكن إن يعبر عنها بالصيغة C_{Li} والتربيعيه C_{Qi}

مجموع مربعات التركيبية الخطية لكل التقابلات المتعددة C_{Li}^2 و التربيعية C_{Qi}^2

$$SS(LB) = \frac{(\sum C_{Li} Y_{j..})^2}{rac \sum C_{Li}^2} \quad (13)$$

$$SS(QB) = \frac{(\sum C_{Qi} Y_{j..})^2}{rac \sum C_{Qi}^2} \quad (14)$$

□□ معادلات العال C فهي كالآتي :

B عبارة عن تركيبة □ طيه (التقابلات المتعددة) بين المعالجات ويمكن إن يعبر عنها بالصيغة B_{Li} والتربيعية B_{Qi} والتكعيبية B_{Ci}

□ مجموع □ ربعات التركيبة الخطية لكل التقابلات المتعددة CB_{Li}^2 و التربيعية B_{Qi}^2 والتكعيبية B_{Ci}^2

$$SS(LC) = \frac{(\sum B_{Li} Y_{..k})^2}{rab \sum CB_{Li}^2} \quad (15)$$

$$SS(QC) = \frac{(\sum B_{Qi} Y_{..k})^2}{rab \sum B_{Qi}^2} \quad (16)$$

$$SS(Cc) = \frac{(\sum B_{Ci} Y_{..k})^2}{rab \sum B_{Ci}^2} \quad (17)$$

التفاعلات الثنائية

$$L BLC = \frac{(\sum L_B L_C)^2}{ra \sum C_{LbLc}^2} \quad (18)$$

وهكذا يجري لكل التفاعلات وكلا حسب عوا□ لها و□ مستوياتها .

التفاعلات الثلاثية

$$SS(ALBLC) = \frac{(\sum AL_B L_C)^2}{r \sum C_{ALbLc}^2} \quad (19)$$

وهكذا أيضا يجري لكل التفاعلات الثلاثية وكلا حسب عوا□ لها و□ مستوياته

Regression Analysis

(11-2) تحليل الانحدار^[3]

هو وسيلة إحصائية لدراسة الاعتمادية بين □ تغير □ عين يسمى المتغير الاستجابة وبين □ تغير □ ر أو □ تغيرات □ رى تسمى المتغيرات التوضيحية , وعليه يمكن تقسيم الانحدار إلى نوعين هما الانحدار الخطي البسيط والانحدار الخطي المتعدد .

Simple Linear Regression (1-11-2) الانحدار الخطي البسيط [3]

نعني بالانحدار البسيط إن يكون المتغير (y) دالة بدلالة المعلمات β و β تغيرا توضيحيا واحدا هو المتغير التوضيحي فقط .

ويمكن تعريفه أيضا على انه نموذج إحصائي لتقدير العلاقة التي تربط بين β تغير كمي واحد وهو المتغير الاستجابة β مع β تغير كمي β ر هو المتغير التوضيحي , وناتج هذا النموذج β عادلة β طيه يمكن تفسير β تغيراتها إحصائيا .

ويمكن صياغة العلاقة الإحصائية بالنموذج الآتي

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + e_i \quad (20)$$

إذ أن

y_i : المتغير التابع

x_i : المتغير المستقل

β_0 : هي β_0 علامة الحد الثابت تعبر عن قيمه Y عند X قيمتها تساوي صفر , نقطة تقاطع β_0 الانحدار β_0 مع المحور الصادي

β_1 : هي β_1 علامة β_1 ميل β_1 الانحدار β_1 مع المحور السيني

فرضيات أنموذج الانحدار الخطي البسيط :

1- إن العلاقة بين المتغير التوضيحي (x) (Independent) و β تغير الاستجابة (y) (Dependent) هي علاقة β طية .

2- ان يتبع الخطأ العشوائي (e) التوزيع الطبيعي (Normal Distribution) بوسط حسابي (Mean) يساوي (0) وتباين (Variance) يساوي (σ^2) عند كل قيمة β ن قيم المتغير المستقل (x) .

5- إن يكون الخطأ العشوائي غير مرتبط بالمتغير المستقل .

6- إن الأخطاء مستقلة عن بعضها البعض $COV(e_i, e_j) = 0$

يتم تحليل تباين نموذج الانحدار الخطي البسيط كما في الجدول (2)

جدول (2) تحليل تباين الانحدار [34]

S.O.V	S.S	D.F	M.S	F
Regression	$SSR = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^{n_i} ((\hat{y}_{ij}) - \bar{y})^2$	1	$MSR = \frac{SSR}{1}$	$F = \frac{MSR}{MSE}$
Residual error	$SSE = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \hat{y}_{ij})^2$	n-2	$MSE = \frac{SSE}{n-2}$	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div> <p>Lack of fit</p> <p>Pure error</p> </div> </div>	$SSLF = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{y}_i - \hat{y}_{ij})^2$	c-2	$MSLF = \frac{SSLF}{n-c}$	$F = \frac{MSLF}{MSPE}$
	$SSPE = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$	n-c	$MSPE = \frac{SSPE}{n-1}$	
Total	$SST = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y})^2$	n-1		

Multiple linear Regression (2-11-2) الانحدار الخطي المتعدد [3]

يعد نموذج الانحدار الخطي المتعدد (النموذج الخطي العام (General linear model) الانحدار الطبيعي للنموذج الخطي البسيط بمتغيرين . ففي حال استعمال K-ن المتغيرات المستقلة (X_1, X_2, \dots, X_K) لتفسير تباين المتغير التابع Y في عاادلة انحدار فان جميع المفاهيم في هذه الحالة تتشابه مع حالة نموذج الانحدار الخطي البسيط غير ان تعدد المتغيرات المستقلة تجعل التعامل مع طرق الجبر الخطي (جبر المصفوفات) هي المستخدمة لتقدير وتبار وتحليل نماذج الانحدار المتعدد وبذلك يمكن تعميمها وتطبيقها على حالات المتغيرين أو الثلاث تغيرات أو إي عددن المتغيرات بشرط لا يفوق عدد المتغيرات على عدد المشاهدات المستخدمة للتقدير .

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i + \dots + e_i \quad (21)$$

(3-11-2) النموذج الخطي العام^[3] (عن طريق نقطة الأصل)

General Linear Model (By the point of origin)

في بعض الأحيان يعتمد الباحث إلى افتراض إن $\beta = 0$ معادلة الانحدار الخطي يمر بنقطة الأصل وفي أحيان أخرى وبعد تحليل الانحدار و t -تبارك عنوية المعلمة الثابتة نصل إلى قناعة بعدم رفض فرضية العدم

$$H_0: B = 0 \quad (22)$$

ضد الفرضية البديلة

$$H_1: B \neq 0 \quad (23)$$

في الحالتين نلجأ إلى تقدير معادلة انحدار β التي تمر بنقطة الأصل وهو ما عملنا عليه في هذه الرسالة وقد أعطى قوة لقرار رفض فرضية العدم

$$H_0: \underline{B} = \underline{0} \quad (24)$$

ضد الفرضية البديلة

$$H_1: \text{at least on } b^s \text{ differ from zero} \quad (25)$$

Orthogonal comparisons

(12-2) المقارنات المتعامدة^[6]

يقال للمركبتين Z_1 و Z_2

$$Z_1 = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \quad (26)$$

$$Z_2 = bx_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n \quad (27)$$

بأنها مركبتان متعامدتان طبيعياً (orthogonal) إذا وفقط إذا تحقق (28 ، 29)

$$a. \sum_{i=1}^n a_i b_i = 0 \quad (28)$$

ويقال إنهما (normalized) إذا تحقق

$$b. \sum_{i=1}^n a_i^2 = \sum_{j=1}^n b_j^2 = 1 \quad (29)$$

$$b_{j,j} = 1, 2, \dots, m \quad a_{i,i} = 1, 2, \dots, n \quad \text{أذن إن}$$

توليفة ليست جميعها أصفار

الشرط a شرط التعادل، والشرط b شرط الطبيعية (طول المتجه يساوي 1)

Multiple comparisons

(13-2) المقارنات المتعددة [9][2]

يتم استعمال تبارات المقارنات المتعددة التي يتم إجراؤها لتحديد الفرق المعنوي للمتوسطات عندما تكون الفروق أو الأتلافات بين متوسطات المعالجات ذات تأثير معنوي حسب أحصاء الأتبار (F) في جدول تحليل التباين (ANOVA) وهذا يمثل رفض الفرضية الصفرية كما في المعادلة (30)، لتحديد أي من العوازل (المعالجات) أو أي مستوى من مستويات العازل (أو العوازل) التي سببت تلك المعنوية أو سبب الفرق. وهناك طرائق كثيرة لإجراء مثل هذه المقارنات ونعرض طريقة تبار طريقة الفرق المعنوي الأصغر **least-significant difference** (LSD).

والفرضية هي :

فرضية العدم (عدم وجود فروقٍ معنوية) بين تـوسـطات المعالجات

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots = \mu_n \quad (30)$$

ضـد الفـرضية البـديـلة (وجود فروقٍ معنوية) بين تـوسـطات المعالجات

$$H_1: \text{at least one of the differ} \quad (31)$$

(14-2) اختبار الفرق المعنوي الأصغر^{[7][2]} least –Significant Difference

هي إحدى تـبـارات المقارنات المتعددة وهذه الطريقة يـرـكـز لها (LSD) وجاءت تسميتها من قيمة (t) التي تستعمل في اختبار الفروق بين المتوسطات وهي أقل قيمة يجب إن يتجاوزها , الفرق بين المتوسطين لكي يكون ذا تأثيرٍ معنوي .

$$LSD_{0.05} = t_{(0.025,x)} \cdot S_d \quad (32)$$

t : تمثل قيمة (t) الجدولية لمستوى معنوية 0.05 وبدرجة حرية الخطأ في جدول تحليل التباين .

Sd : الخطأ المعياري الذي يستعمل لاختبار الفرق بين تـوسـطـي مجموعتين وصيغته

S^2_e : الخطأ التجريبي

• في حالة عدم تساوي عدد التكرارات لكل المعالجات

$$S_d = \sqrt{se^2 \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)} \quad (33)$$

r 1 : التكرار للمجموعة الأولى

r 1 : التكرار للمجموعة الأولى الدالة في المقارنة .

• في حالة تساوي عدد المشاهدات لكل المعالجات r1=r2

$$Sd = \sqrt{\frac{2 S_e^2}{r}} \quad (34)$$

ويتم حساب الفرق بين إي-توسطين ويقارن مع قيمة LSD فكل فرق عنوي أكبر أو يساوي قيمة LSD يعد فرقاً عنوياً (significant) , وعندئذ يكون الفرق أقل من قيمة LSD فهو فرق غير عنوي (not significant).

بعد استعراض الأساليب الإحصائية التي يمكن استعمالها في تحديد تأثير المعالجات على تغيير الاستجابة سيتم تطبيق هذه الأساليب على تجربة حقيقة تم إجراؤها من قبل الباحثة في جامعة بابل | كلية العلوم | قسم علوم الحياة

الفصل الثالث

الجانب التطبيقي

الفصل الثالث

الجانب التطبيقي

Introduction

(1-3) المقدمة

يسلط هذا الفصل الضوء على حالة تطبيقية لما تم ذكره في الفصل الثاني (الجانب النظري) إذ إن الجانب التطبيقي يعد من أساسيات البحث العلمي عن طريقه نتعرف على أبعاب الظاهرة المدروسة والوصول إلى النتائج الحقيقية ومناقشتها , انسجاماً مع هدف ومتطلبات الدراسة , نفذنا تجربة زراعية أنجزت تحت ظروف مختبرية في جامعة بابل كلية العلوم للمدة من 20/10/2017 - 1/11/2017 طبقت الطرائق والاختبارات الإحصائية التي ذكرت في الجانب النظري على بيانات التجربة الزراعية من اجل بيان وتوضيح اثر بعض العوامل المسلطة على معايير التجربة الزراعية المدروسة واختيار النسب للمعالجات المستعملة للحصول على أفضل استجابة ممكنة .

تم تحليل البيانات وتقدير معلمات أنموذج التصميم المستعمل بمساعدة البرامج الآتية :-

- IBM spss statistics V(17.0) .
- Excel V(2007)

* التجربة تمت تحت إشراف الدكتورة وسن مضر أبو التمن

(2-3) وصف التجربة

Describe the Experiment

نقعت بذور نبات الخيار *Cucumis sativus* L. لمدة زمنية مختلفة (0, 6,12,24) ساعة في تراكيز مختلفة من المستخلص المائي للشاي الأخضر الذي حضر بغلي 100 مل من الماء المقطر وأضيف إليه 10 غم من أوراق الشاي الأخضر للحصول على منقوع الشاي الأخضر بتركيز 10%. وتم استعمال قانون التخفيف.

(التركيز الأول للمحلول المركز × الحجم الأول للمحلول المركز = التركيز الثاني للمحلول المخفف × الحجم الثاني للمحلول المخفف)

لعمل التراكيز المطلوبة لإجراء التجربة وهي (0.001, 0.01, 0.1) %

وضعت البذور في أطباق بتري بواقع 25 بذرة في الطبق الواحد ثم عرضت البذور للإجهت الملحي في التراكيز (0, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5) dsm/m، وبواقع ثلاث مكررات للمعاملة الواحدة، وتم الاحتفاظ بها في غرفة النمو التي تمتاز بظروف إنبات قياسية (إضاءة مستمرة 3000_3500 ورجة حرارة 25) رجة مئوية ورطوبة نسبية (60_70) % و طبقت التجربة العملية وفق تصميم الكامل العشوائية (CRD) مع مراعاة مواصفات التجربة الجيدة من حيث التكرار والتجانس والتعشية .

(3-3) وصف البيانات

Describing of the Data

أشير إلى المتغيرات المستعملة في التجربة الزراعة المقامة حسب التصميم الكامل العشوائية (CRD) وكما يأتي :

Y : متغير الاستجابة الذي يمثل نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار

A : العامل الأول تركيز الشاي الأخضر وله ثلاثة تراكيز

a_1 : (0.1) غم .

a_2 : (0.01) غم .

a_3 : (0.001) غم .

B : العامل الثاني مدة حضى(تنقيع) بذور نبات الخيار في محلول الشاي الأخضر وله أربع مستويات هي

b_1 : 0 ساعة (معاملة سيطرة)

b_2 : 6 ساعة

b_3 : 12 ساعة

b_4 : 24 ساعة

C : العامل الثالث نسب تركيز الملح وله خمس مستويات

c_1 : بدون إضافة (0) . (معاملة سيطرة)

c_2 : تركيز (1.5) dsm/m .

c_3 : تركيز (2.5) dsm/m .

c_4 : تركيز (3.5) dsm/m .

c_5 : تركيز (4.5) dsm/m .

وبعد مرور المدة الزمنية للتجربة وهي (10) أيام , وسجلت البيانات المطلوبة عن التجربة وذلك بقياس نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار بواسطة جهاز (chlorometer) كما في الجدول الملحق (1)

(4-3) الأساليب الإحصائية المستعملة

تم استعمال الأساليب الإحصائية الآتية :

1. التجربة العاملية على وفق تصميم الكامل العشوائية .
2. تحليل الاتجاهات .
3. تحليل الانحدار .
4. المتوسط الحسابي .
5. اختبار chi-square لاختبار طبيعة البيانات .
6. اختبار Lsd للمقارنة بين الفروق .
7. تحليل التباين

تمت عملية اختبار بيانات الكلوروفيل على وفق التوزيع الطبيعي باستعمال اختبار (Chi-square) وبعد إن اجتازت البيانات الاختبار الطبيعي بمستوى معنوية (0.05) تم إجراء التحليل كما يأتي

(5-3) اختبار التوزيع الطبيعي

أُرجت البيانات في جدول تكراري فيه ثمانية فئات , طول الفئة 5 كما في الجدول (3) وكانت التكرارات المشاهدة والنظرية وقيمة (χ^2) كما يأتي :


H₀ : البيانات تتبع التوزيع الطبيعي .
H₁ : البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي .

الجدول (3) اختبار طبيعة البيانات

فئات	تكرار مشاهد	تكرار نظري	chi square
28.5-33.5	6	5.652	0.021
33.5-38.5	13	11.191	0.292
38.5-43.5	22	22.745	0.024
43.5-48.5	29	34.728	0.945
48.5-53.5	36	39.685	0.342
53.5-58.5	30	33.901	0.449
58.5-63.5	30	21.679	3.194
63.5-68.5	14	10.420	1.230

$$\chi^2 = 6.49$$

وعليه فإن قيمة P_value هي ($\alpha = 0.517$) وهذا يعني ان عدم رفض فرضية العدم التي تنص على طبيعة البيانات .



(6-3) تحليل البيانات

تم إجراء تحليل التباين للتجربة العاملية (5*4*3*3) وكانت النتائج كما في الجدول (4)

يظهر من جدول تحليل التباين (4) إن لتركيز العوامل الثلاثة (الشاي الأخضر ومدة تنقيع البذور في محلول الشاي الأخضر والتركيز الملحي) تأثيرات مختلفة معنوية على الاستجابة المتمثلة بنسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار , كما كان للتفاعلات الثنائية بين العوامل تأثيرات معنوية أيضا وكذا الحال بالنسبة للتفاعلات الثلاثية .

وهذا يعني عدم استقلالية كل عامل عن العامل الأخر أو العاملين الآخرين في تأثيرها بالاستجابة , إي إن لهذه العوامل تأثيرا مشتركا في الاستجابة .

فرضيات التحليل

تفسر نتائج جدول تحليل التباين ANOVA على أساس الفرضيات الآتية .

H_0 : لا يوجد تأثير معنوي لمستويات الشاي (A) على نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

H_1 : يوجد تأثير معنوي لمستويات الشاي (A) على نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

H_0 : لا يوجد تأثير معنوي للمدة الزمنية (B) لحظي (تنقيح) بذور الخيار على نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

H_1 : يوجد تأثير معنوي للمدة الزمنية (B) لحظي (تنقيح) بذور الخيار على نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار.

H_0 : لا يوجد تأثير معنوي لتركيز الملح (C) على نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

H_1 : يوجد تأثير معنوي لتركيز الملح (C) على نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

الجدول (4) تحليل التباين لبيانات الكلوروفيل في الورقة

S.O.V	S.S	d.f	M.S	F	P_value
Treatment	11539.04	59	195.577	6.497	0.00000
A	1439.45	2	719.727	23.908	0.00000
B	2944.84	3	981.613	32.608	0.00000
C	514.96	4	128.741	4.277	0.00286
AB	1213.35	6	202.225	6.718	0.00000
AC	1480.91	8	185.114	6.149	0.00000
BC	2587.38	12	215.615	7.162	0.00000
ABC	1358.13	24	56.589	1.880	0.01409
Error	3612.41	120	30.103		
Total	15151.45	179			

كما تم إجراء تحليل التباين للبيانات قيد الدراسة بعد حذف مشاهدات المدة الزمنية 24 ساعة المتمثلة بالمعالجة B4 وذلك لكون المسافة غير متساوية بين مدة زمنية وأخرى .

خضعت البيانات التي جمعت عن التجربة المختبرية لتأثير الشاي الأخضر والزمن و التركيز الملحي في نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار بعد حذف B4 إلى التحليل الإحصائي للتصميم تام التعشيه وكما تم الحصول على جدول تحليل التباين كما في الجدول (5) .

وتبين إن للمعالجات وتفاعلاتها تأثيرات معنوية في الاستجابة ولم تتغير نتائج اتخاذ القرار عما كانت عليه في الجدول (4)

إذ عمد الباحث إلى حذف المعالجة B4 لغرض إجراء التحليل العاملي للبيانات وتجزئة التأثيرات للعوامل إلى تأثيرات خطية ,تربيعية ..الخ , وتفاعل تأثيرات العوامل .

الجدول (5) تحليل التباين لبيانات الكلوروفيل في الورقة بعد حذف B4

S.O.V	S.S	d.f	M.S	F	P_value
Treatment	9991.465	44	227.0788	8.937098	1.87E-18
A	1218.343	2	609.1716	23.97506	4.5E-09
B	2918.216	2	1459.108	57.42586	8.44E-17
C	1136.476	4	284.1191	11.18202	2.08E-07
AB	1191.417	4	297.8543	11.7226	1.05E-07
AC	960.1353	8	120.0169	4.723484	7.38E-05
BC	1661.375	8	207.6719	8.173305	3E-08
ABC	905.5021	16	56.59388	2.227355	0.009255
Error	2286.77	90	25.40856		
Total	12278.24	134			

ولأجل ذلك تم تجزئة تأثير كلا من العوامل (A, B ,C) إلى المركبات العائدة لها [بعد حذف السيطرة من المدة الزمنية والتركيز الملحية] وتفاعل هذه المركبات بين العوامل الداخلة في التجربة والجدول (6) يمثل تحليل التباين لتأثير العوامل ومركباتها .

اظهر التحليل الإحصائي للبيانات في جدول تحليل التباين (6) ما يأتي :

الجدول (6) تحليل بيانات الكلوروفيل للعوامل الداخلة في التجربة بعد حذف معالجة السيطرة من المدة الزمنية والتراكيز الملحية .

S.O.V	S.S	Df	M.S	F	P_ value
Treatment	6338.05	35	181.09	7.33	6.59E-13
A	897.05	2	448.52	18.15	4.15E-07
B	1807.26	2	903.63	36.56	1.10E-11
Lb	851.13	1	851.13	34.44	1.24E-07
Qb	956.13	1	956.13	38.69	2.92E-08
C	737.78	3	245.93	9.95	1.44E-05
Lc	558.96	1	558.96	22.62	9.87E-06
Qc	17.44	1	17.44	0.71	4.04E-01
Cc	161.38	1	161.38	6.53	1.27E-02
AB	873.24	4	218.31	8.83	7.35E-06
AC	313.69	6	52.28	2.12	6.18E-02
BC	1002.69	6	167.11	6.76	1.03E-05
LbLc	351.95	1	351.95	14.24	3.28E-04
LbQc	4.48	1	4.48	0.18	6.72E-01
LbCc	83.47	1	83.47	3.38	7.02E-02
QbLc	330.28	1	330.28	13.36	4.84E-04
QbQc	122.78	1	122.78	4.97	2.89E-02
QbCc	109.73	1	109.73	4.44	3.86E-02
ABC	706.35	12	58.86	2.38	1.19E-02
Error	1779.34	72	24.71		
Total	8117.39	107	75.86		

- 1- الشاي الأخضر: وجو[□] فروق معنوية بين مستويات الشاي في تأثيرها على نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .
- 2- المدة الزمنية للتتبع : وجو[□] فروق معنوية بين المد[□] الزمنية المختلفة لتتبع البذور في الماء الحار للشاي الأخضر . تم تجزئة هذا التأثير إلى مركبة خطية وأخرى تربيعية و ظهر بان للمركبتين تأثيرا معنويا بالاستجابة .

من خلال متوسطات المعالجات تبين إن المدة الزمنية للتنقيح تؤثر إلى زيادة نسبة الكلوروفيل في الورقة ثم يبدأ الكلوروفيل بالانخفاض عند زيادة المدة الزمنية للتنقيح وهذا ما يعني وجود نقطة نهاية عظمى يمكن تحديدها عن طريق الانحدار .

3- التراكيز الملحية: وجود فروق معنوية في تأثير نسبة الأملاح بنسبة الكلوروفيل في الورقة إذ تنخفض نسبة الكلوروفيل في الورقة بزيادة تركيز الأملاح بشكل خطي كون المركبة الخطية ذات تأثير معنوي بينما لم يكن للمركبة التربيعية تأثير معنوي وإذ اظهر التحليل وجود تأثير معنوي للمركبة التكعيبية فأن ذلك يدل على عدم قدرة تسجيل البيانات أو تعرض التجربة إلى ظروف خارج المرسوم لها .

4- تفاعل الشاي الأخضر مع المدة الزمنية للتنقيح (AB) : كان للمدة الزمنية تأثير معنوي بوجود و عدم وجود مستويات الشاي الأخضر على نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

5- تفاعل الشاي الأخضر مع التراكيز الملحية (AC) : كان لتفاعل الشاي الأخضر مع التراكيز الملحية تأثير معنوي على نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

6- تفاعل المدة الزمنية مع التراكيز الملحية (BC) : كان لتفاعل المدة الزمنية للتنقيح البذور مع التراكيز الملحية تأثير معنوي على نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار.

وقد تم تجزئة هذا التفاعل إلى تفاعل المركبات العائدة لكل عامل وكما يأتي :

i. كان لتفاعل المركبة الخطية للمدة الزمنية للتنقيح مع المركبة الخطية للتراكيز الملحية تأثير معنوي , بينما لم يكن للمركبة الخطية تأثير معنوي مع المركبة التربيعية , كذلك الحال كان التأثير غير معنوي للمركبة الخطية للمدة الزمنية للتنقيح مع المركبة التكعيبية على متغير الاستجابة .

ii. كان لتفاعل المركبة التربيعية للمدة الزمنية للتنقيح مع كلا من المركبة الخطية للتراكيز الملحية, والمركبة التربيعية و التكعيبية تأثير معنوي على متغير الاستجابة .

7- التفاعل الثلاثي (ABC) كان معنوياً أيضا .

(7-3) اختبار الفروق المطلقة

ولأجل تحديد المتوسطات التي سببت الفروق المعنوية في تأثيرات العوامل وتفاعلاتها تم استعمال اختبار المقارنات المتعامدة لـ (Lsd) لتحديد أفضل المتوسطات المسببة للفروق المعنوية .

A. اختبار الفروق بين متوسطات تأثير نسب مستويات الشاي الأخضر
تم حساب قيمة (Lsd) للفروق المعنوية بين متوسطات الاستجابة وفقا لتركيز الشاي الأخضر فكانت قيمة (Lsd) .

$$lsd = t(0.025,72) \sqrt{\frac{2(24.71)}{36}} \quad (35)$$

$$lsd = 1.99 * 1.172 = 2.33 \quad (36)$$

أظهر النتائج في الجدول (7) وجود فروق معنوية بين المستوى الثاني للشاي الأخضر (0.01) والمستوى الثالث للشاي الأخضر (0.001) وكذلك المستوى الثاني للشاي الأخضر (0.01) مع المستوى الأول للشاي الأخضر (0.1) .

$$a_2 - a_3 = 6.427 > lsd$$

$$a_2 - a = 5.741 > lsd$$

وان المستوى الثاني يعطي أفضل تأثير على نسب الاستجابة المتمثلة بنسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

الجدول (7) الفروق المطلقة بين متوسطات مستويات الشاي الأخضر

A		a3	a1	a2
		49.5028	50.1889	55.9306
a3	49.5028	0		
a1	50.1889	0.68611	0	
a2	55.9306	6.42778	5.74167	0

B. اختبار الفروق المطلقة بين متوسطات المدة الزمنية للتنقيح وفقا لمستويات التنقيح

$$lsd = 1.99 * 1.172 = 2.33 \quad (37)$$

أظهرت النتائج في الجدول (8) وجود فروق معنوية بين المدة الزمنية الرابعة (24) ساعة مع المدة الزمنية الثانية (6) ساعة , وكذلك وجود فروق معنوية بين المدة الزمنية الثالثة (12) ساعة مع المدة الزمنية الثانية (6) , وكذلك وجود فروق معنوية بين مدة التنقيح الثالثة (12) ساعة مع المدة الزمنية الرابعة (24) ساعة , وان المدة الزمنية الثالثة (12) ساعة تعطي أفضل استجابة .

الجدول (8) الفروق المطلقة بين متوسطات المدة الزمنية للتنقيح

B		b2	b4	b3
		46.3319	53.2083	56.0819
b2	46.3319	0		
b4	53.2083	6.87639	0	
b3	56.0819	9.75	2.87361	0

C. اختبار الفروق المطلقة بين متوسطات تراكيز الملح

$$lsd = t(0.025,72) \sqrt{\frac{2(24.71)}{27}} \quad (38)$$

$$lsd = 1.99 * 1.35 = 2.69 \quad (39)$$

أظهرت النتائج في الجدول (9) وجود فروق معنوية بين التركيز الملحي الرابع (dsm/m3.5) والتركيز الملحي الخامس (dsm/m4.5) مع التركيز الملحي الثالث (dsm/m2.5) , كذلك وجود فروق معنوية بين التركيز الملحي الرابع (dsm/m3.5) والتركيز الملحي الخامس (dsm/m4.5) مع التركيز الملحي الثاني (dsm/m1.5) .

الجدول (9) الفروق المطلقة بين متوسطات التراكيز الملحية

C		c3	c2	c4	c5
		48.81481	49.77037	54.12963	54.78148
c3	48.8148	0			
c2	49.7704	0.95556	0		
c4	54.1296	5.31481	4.35926	0	
c5	54.7815	5.96667	5.01111	0.65185	0

D. اختبار الفروق المطلقة لمتوسطات تفاعل مستويات الشاي الأخضر مع المدد الزمنية للنتقيع على متغير الاستجابة .

$$lsd = t(0.025,72) \sqrt{\frac{2(24.71)}{9}} \quad (40)$$

$$lsd = 1.99 * 2.34 = 4.66 \quad (41)$$

أظهرت النتائج في الجدول (10) اغلب تفاعلات مستويات الشاي الأخضر مع المدد الزمنية للنتقيع وجوًا فروق معنوية ومؤثرة في نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

في المستوى الثاني للشاي الأخضر (0.01) ظهرت فروق معنوية من جهة مع المدد الزمنية الثالثة (12) ساعة إذ ان الشاي الأخضر في المدد الزمنية الثالثة (12) يعطي أفضل (a2b3)

ويكون ذا تأثير بنسبة اقل مع المدد الزمنية الرابعه (24) ساعة , بينما لم يكن للمستوى الثاني للشاي (0.01) فروق معنوية مع المدد الزمنية (6) ساعة .

لم يكن للمستوى الثالث للشاي الأخضر (0.001) تفاعلً معنوي مع المدد الزمنية (24) ساعة وكذلك لم يكن له تفاعل مع المدد الزمنية (6) ساعة , وظهرت له فروق معنوية مع المدد الزمنية (12) ساعة .

في تفاعل المستوى الأول للشاي (0.1) مع المدد الزمنية ظهرت فروق معنوية في المدد الزمنية (12) ساعة وكذلك (24) ساعة كانت مؤثرة في نسب الكلوروفيل في الورقة , أيضا كان المستوى غير معنوي عند المدد الزمنية (6) ساعة .

الجدول (10) الفروق المطلقة لمتوسطات تفاعل الشاي الأخضر مع المدد الزمنية للنتقيع

AB		a1b2	a3b4	a2b2	a3b2	a1b3	a1b4	a3b3	a2b4	a2b3
		46.196	46.3	46.4	46.4	51.046	53.325	55.808	60	61.392
a1b2	46.196	0								
a3b4	46.3	0.1042	0							
a2b2	46.4	0.2042	0.1	0						
a3b2	46.4	0.2042	0.1	0	0					
a1b3	51.046	4.85	4.7458	4.6458	4.6458	0				
a1b4	53.325	7.1292	7.025	6.925	6.925	2.2792	0			
a3b3	55.808	9.6125	9.5083	9.4083	9.4083	4.7625	2.4833	0		
a2b4	60	13.804	13.7	13.6	13.6	8.9542	6.675	4.1917	0	
a2b3	61.392	15.196	15.092	14.992	14.992	10.346	8.0667	5.5833	1.3917	0

E. اختبار الفروق المطلقة لمتوسطات تفاعل مستويات الشاي الأخضر مع التراكيز الملحية على متغير لاستجابة

$$lsd = t(0.025,72) \sqrt{\frac{2(24.71)}{12}} \quad (42)$$

$$lsd = 1.99 * 2.03 = 4.038 \quad (43)$$

أظهرت النتائج في الجدول (11) وجود فروق معنوية بين مستويات الشاي الأخضر و التراكيز الملحية , إذ كان أفضل تأثير للشاي الأخضر في مستواه الثاني (0.01) على التركيز الملحي الرابع والخامس على الترتيب (3.5dsm/m)(4.5dsm/m) . إذ أعطى أفضل استجابة .

الجدول(11) الفروق المطلقة لمتوسطات تفاعل مستوى الشاي الأخضر مع التركيز الملحي

AC		a3c3	alc2	a3c2	alc3	alc5	a3c4	alc4	a2c3	a2c2	a3c5	a2c4	a2c5
		32.167	35.18	36.81	37.73	38.28	38.88	39.38	39.94	39.99	40.65	43.5	44.3
a3c3	32.2	0											
alc2	35.2	3.0167	0										
a3c2	36.8	4.6417	1.625	0									
alc3	37.7	5.5583	2.542	0.917	0								
alc5	38.3	6.1083	3.092	1.467	0.55	0							
a3c4	38.9	6.7167	3.7	2.075	1.158	0.608	0						
alc4	39.4	7.2167	4.2	2.575	1.658	1.108	0.5	0					
a2c3	39.9	7.775	4.758	3.133	2.217	1.667	1.058	0.558	0				
a2c2	40	7.825	4.808	3.183	2.267	1.717	1.108	0.608	0.05	0			
a3c5	40.7	8.4833	5.467	3.842	2.925	2.375	1.767	1.267	0.708	0.658	0		
a2c4	43.5	11.358	8.342	6.717	5.8	5.25	4.642	4.142	3.583	3.533	2.875	0	
a2c5	44.3	12.167	9.15	7.525	6.608	6.058	5.45	4.95	4.392	4.342	3.683	0.81	0

F. اختبار الفروق المطلقة لمتوسطات تفاعل المدة الزمنية مع التراكيز الملحية على متغير لاستجابة.

$$lsd = 1.99 * 2.03 = 4.038 \quad (44)$$

في الجدول (12) ظهر أفضل تأثير معنوي في تفاعل المدة الزمنية الثالثة (12) ساعة مع التراكيز الملحية إذ كانت مؤثرة في التركيز الملحي الثاني والخامس (dsm/m1.5) (dsm/m4.5) على الترتيب كذلك كانت مؤثرة بنسبة اقل في التركيز الملحي الرابع (dsm/m3.5) وكذلك عند التركيز الملحي الثالث (dsm/m2.5) .

المدة الزمنية الرابعة (24) ساعة كانت مؤثرة في التراكيز الملحي الرابع (dsm/m3.5) وبنسبة اقل في التركيز الملحي الخامس (dsm/m4.5). وتقل النسبة كلما قل التركيز الملحي .

في المدة الزمنية الزمنية الثانية (6) كانت غير معنوية مع التركيز الملحي الثالث (dsm/m2.5) وظهرت معنوية في التراكيز الملحية الرابع (dsm/m3.5) والخامس (dsm/m4.5) بنسب قليلة .

الجدول (12) الفروق المطلقة لمتوسطات تفاعل المدة الزمنية للتنبيع مع التراكيز الملحية

BC		b2c2	b2c3	b4c3	b4c2	b2c5	b2c4	b3c4	b4c5	b3c3	b4c4	b3c5	b3c2
		29.55	30.25	38.68	38.81	39.05	40.15	40.36	40.85	40.9	41.28	43.36	43.63
b2c2	29.55	0											
b2c3	30.25	0.7	0										
b4c3	38.68	9.133	8.433	0									
b4c2	38.81	9.258	8.558	0.125	0								
b2c5	39.05	9.496	8.796	0.363	0.237	0							
b2c4	40.15	10.6	9.9	1.467	1.342	1.104	0						
b3c4	40.36	10.81	10.11	1.675	1.55	1.312	0.208	0					
b4c5	40.85	11.3	10.6	2.167	2.042	1.804	0.7	0.492	0				
b3c3	40.9	11.35	10.65	2.217	2.092	1.854	0.75	0.542	0.05	0			
b4c4	41.28	11.73	11.03	2.6	2.475	2.238	1.133	0.925	0.433	0.383	0		
b3c5	43.36	13.81	13.11	4.679	4.554	4.317	3.213	3.004	2.513	2.463	2.079	0	
b3c2	43.63	14.08	13.38	4.942	4.817	4.579	3.475	3.267	2.775	2.725	2.342	0.262	0

(8-3) تقدير تأثيرات العوامل على الاستجابة

لأجل قياس مقدار التأثير الذي يطرأ على نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار تم اللجوء إلى تقدير معاملات الانحدار التي تربط بين العوامل التوضيحية ونسب الكلوروفيل بعد حذف معالجة السيطرة من المدة الزمنية و التراكيز الملحية ، فإذا رمزنا إلى

Y : متغير الاستجابة الذي يمثل نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار

X1 : الشاي الأخضر (0.1, 0.01, 0.001) %

X2 : المدة الزمنية للتنقيح (0, 6, 12, 24) ساعة

X3 : التراكيز الملحية (0, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5) dsm/m

فإن المعادلة التقديرية التي تربط بين العوامل الثلاثة (الشاي الأخضر , المدة الزمنية للتنقيح , التركيز الملحي) والاستجابة هي

$$y = 59.03 - 25.53x_1 - 0.34x_2 - 0.092x_3 \quad R^2 = 11.84\% \quad \alpha = 0.0043 \quad (45)$$

وهذا ما لا يتفق مع الواقع

إذ تشير هذه المعادلة إلى أن نسبة تركيز الكلوروفيل في الورقة هي 59.03 في حال عدم استعمال الشاي الأخضر أو الملح عند بداية الإنبات ثم تبدأ بعدها هذه النسبة بالانخفاض كلما زاد تركيز الملح وزاد تركيز الشاي وانضمت مدة تنقيع البذور في الشاي الأخضر وهذا مخالف تماما للواقع إذ إن الأوراق الأولى للنبات تخرج باللون الأصفر لذلك لجأ الباحث إلى تقدير المعادلة الخطية

$$y = b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e_{ij} \quad (46)$$

والتي تربط بين معدل تركيز الكلوروفيل مع معدل المعالجات الداخلة في التجربة فحصلنا على المعادلة الآتية

$$y = 62.729x_1 + 0.849x_2 + 11.346x_3 \quad R^2 = 88.18\% \quad \alpha = 2.9E-48 \quad (47)$$

$$Sd \quad (39.125) \quad (0.204) \quad (1.04)$$

وهي معادلة ذات معنوية عالية جدا وتستطيع أن تفسر 88.18% من التغيرات في نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .

الجدول (13) تحليل تباين الانحدار للعوامل الثلاثة الداخلة (x1,x2,x3) مع (Y)

S.O.V	S.S	DF	M.S	F	Sig
Regression	274023.21	3	91341.07	261.2	2.9E-48
Residual error	36714.70	105	349.66		
Total	310737.92	108			

وتم تقدير المعادلات الخطية بين نسبة الكلوروفيل وكل معالجة بشكل منفصل فكانت كما يأتي :

(1-8-3) تقدير تأثير محلول الشاي الأخضر في نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار

تم تقدير المعامل الخطية

بطريقة المربعات الصغرى فحصلنا على المعامل التقديرية الآتية :

$$y = 567.445x + 1 \quad R^2 = 37.68\% \quad \alpha = 1.3E - 13 \quad (48)$$

$$sd \quad (70.45)$$

$$H_0: \beta = 0$$

وإذ أن احتمال رفض فرضية العدم

$$H_0: \beta \neq 0$$

ضد الفرضية البديلة

هي ($\alpha = 1.3E - 13$) فهذا يعني وجود علاقة خطية بين تركيز الشاي الأخضر ونسبة الكلوروفيل في الورقة غير إن هذه العلاقة تعاني من عدم قدرة تشخيص المعامل الخطية كعلاقة \square الية بين تركيز الشاي الأخضر ونسبة الكلوروفيل في الورقة يدعم ذلك قيمة معامل التوضيح ($R^2 = 37.68\%$) فضلا عن اختبار نقص الدقة الذي اظهر معنوية عالية كما في جدول تحليل التباين (الجدول 14) إذ كان احتمال رفض فرضية العدم وجود نقص في \square قة الأنموذج هو ($9.3 E-83$) , هذا يعني إن النموذج الخطي يعاني من نقص في \square قة تمثيله للعلاقة بين تركيز الشاي الأخضر ونسبة الكلوروفيل .

الجدول(14) تحليل تباين الانحدار (x1,y)

S.O.V	S.S	DF	M.S	F	Sig	
Regression	117089	1	117089	64.7	1.3E-13	
Residual error	193649	107	1809.8			
	Lack of fit	187892.8	1	187892.8	3469.3	9.3 E-83
	Pure error	5756.166	106	54.30		
Total	310738	108				

(2-8-3) تقدير تأثير المدخ الزمنية للتنتيع في نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار

تم تقدير المعادلة الخطية

بطريقة المربعات الصغرى فحصلنا على المعادلة التقديرية الآتية :

$$y = 2.87x2 \quad R^2 = 72.11\% \quad \alpha = 2.5E - 31 \quad (49)$$

sd (0.173)

$H_0: \beta = 0$ و إذ أن احتمال رفض فرضية العدم

$H_0: \beta \neq 0$ ضد الفرضية البديلة

هي ($\alpha = 2.5E - 31$) فهذا يعني وجوب علاقة خطية بين تركيز المدخ الزمنية ونسبة الكلوروفيل في الورقة غير إن هذه العلاقة تعاني من عدم قدرة تشخيص المعادلة الخطية كعلاقة بين المدخ الزمنية ونسبة الكلوروفيل في الورقة يدعم ذلك قيمة معامل التوضيح ($R^2 = 72.11\%$) فضلا عن اختبار نقص الدقة الذي اظهر معنوية عالية كما في جدول تحليل التباين (الجدول 15) إذ كان احتمال رفض فرضية العدم وجوب نقص في قدرة الأنموذج هو ($1.4 E-61$) هذا يعني إن النموذج الخطي يعاني من نقص في قدرة تمثيله للعلاقة بين المدخ الزمنية للتنتيع ونسبة الكلوروفيل .

الجدول(15) تحليل تباين الانحدار(x2,y)

S.O.V	S.S	DF	M.S	F	Sig	
Regression	224066	1	224066	276.6	2.5E-31	
Residual error	86672	107	810.02			
	Lack of fit	80213.4	1	80213.4	1316.5	1.4 E-61
	Pure error	6458.616	106	60.93		
Total	310738	108				

(3-8-3) تقدير تأثير تراكيز الملح في نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار

تم تقدير المعادلة الخطية

بطريقة المربعات الصغرى فحصلنا على المعادلة التقديرية الآتية :

$$\hat{y} = 15.51x3 \quad R^2 = 85.65\% \quad \alpha = 1.1E - 46 \quad (50)$$

$$sd \quad (0.614)$$

$H_0: \beta = 0$ و إذ أن احتمال رفض فرضية العدم

$H_0: \beta \neq 0$ ضد الفرضية البديلة

هي ($\alpha = 1.1E - 46$) فهذا يعني وجوب علاقة خطية بين التراكيز الملحية ونسبة الكلوروفيل في الورقة غير إن هذه العلاقة تعاني من عدم قدرة تشخيص المعادلة الخطية كعلاقة \square الية بين التراكيز الملحية ونسبة الكلوروفيل في الورقة يدعم ذلك قيمة معامل التوضيح ($R^2 = 85.7\%$) فضلا عن اختبار نقص الدقة الذي اظهر معنوية عالية كما في جدول تحليل التباين (الجدول 16) إذ كان احتمال رفض فرضية العدم وجوب نقص في قدرة الأنموذج هو ($4.1E-44$) هذا يعني إن النموذج الخطي يعاني من نقص في قدرة تمثيله للعلاقة بين المتغيرين الزمنية للتنقيع ونسبة الكلوروفيل .

الجدول(16) تحليل تباين الانحدار (x3,y)

S.O.V	S.S	DF	M.S	F	Sig	
Regression	266151	1	266151	638.7	1.1E-46	
Residual error	44587	107	416.70			
	Lack of fit	37490.4	1	37490.4	560.14	4.1E-44
	Pure error	7095.626	106	66.93		
Total		310738	108			

يتضح من المعاملات الخطية الثلاث التقديرية المذكورة أنفا إن نسبة الملح في المحلول تؤثر في الدور الأكبر في التأثير بنسبة الكلوروفيل ضمن حدود الدراسة إذ أنها توضح بشكل منفصل 85.7% من التغيرات في نسبة الكلوروفيل .

يأتي بعد ذلك دور المدة الزمنية لتنقيع البذور في محلول الشاي الأخضر إذ أنها تمثل 72.11% من التغيرات في نسبة الكلوروفيل بشكل منفصل

ثم يأتي دور نسبة تركيز الشاي التي تستطيع أن تفسر 37.67% من التغيرات في نسبة الكلوروفيل .

يتضح من جدول تحليل التباين (الجدول 17) الخاص بقياس تأثير مدة تنقيع البذور في محلول الشاي بوجود الملح كانت المعادلة كما يأتي

$$y = 0.899x_2 + 11.82x_3 \quad R^2 = 87.9\% \quad \alpha = 2.05E - 49 \quad (51)$$


وان مقدار التغير في R^2 هي 2.24%

وان إضافة X_1 لن تؤثر إلى تأثير معنوي في الاستجابة من جانب وان مقدار الزيادة في قيمة التوضيح R^2 هو 0.29% .


الجدول (17) تحليل تباين الانحدار للمتغيرين X_2, X_3

S.O.V	S.S	DF	M.S	F	Sig
Regression	273124	2	136562	384.9	4.6E-49
	6973.1	1	6973.1	19.65	2.3E-05
Residual error	37614	105	354.84		
Total	310738	108			


و بالوقت نفسه فان مقدار ما يضيفه العامل X_3 إلى معامل التحديد بوجود X_2 هو 15.79% وهو ما يؤكد إن لنسبة الملح والمدة الزمنية تأثيرا مشتركا (تفاعل)




الشكل (2) رسوم بيانات الكلوروفيل للعوامل مع مستوياتها (a) الشاي الأخضر , (b) المدة الزمنية للتفتيح و (c) تراكيز الملح





الشكل (3) رسوم متوسطات بيانات الكلوروفيل للعوامل والمستويات (a , b , c)






الشكل (4) تأثير كلا من المدة الزمنية وتركيز الملح في مستويات الشاي الأخضر



الشكل (5) المدد الزمنية للتنقيح في المستوى الاول للشاي الاخضر







الفصل الرابع

الاستنتاجات

و

التوصيات

الفصل الرابع

الإستنتاجات والتوصيات

Conclusions

(1-4)الإستنتاجات

عن طريق ما تقدم أظهرت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات قيد الدراسة ما يأتي :

- 1- تختلف مستويات تركيز الشاي الأخضر في تأثيرها □ نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار وكان أفضل هذه التراكيز هو المستوى الثاني (0.01).
- 2- تختلف مستويات المدة الزمنية للتنقيع في تأثيرها □ نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار وكان أفضل هذه المدد هو المدة الزمنية (12) ساعة .
- 3- تختلف التراكيز الملحية في تأثيرها □ نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار وكان أفضل هذه التراكيز هو التركيز الملحي الخامس (4.5) dsm/m
- 4- التفاعلات الثنائية :كان لتفاعل الشاي الأخضر مع المدة الزمنية للتنقيع تأثير معنوي في الإستجابة وكذلك كان للشاي الأخضر تأثير معنوي على التركيز الملحية .و تفاعل المدة الزمنية للتنقيع مع التراكيز الملحية أيضا لها تأثير معنوي □ نسب الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار .
- 5- كان للمركبة الخطية لمدة التنقيع في الشاي الأخضر من جدول (6) تأثير معنوي في نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار ما يعني أن زيادة المدة الزمنية للتنقيع في الشاي الأخضر تؤدي إلى زيادة في نسبة الكلوروفيل لكن هذه الزيادة تبدأ □ الانخفاض وهو ما يؤكد معنوية المركبة التريية التي أظهرت معنوية أيضا
- 6- كانت المركبة الخطية للتركيز الملحي ذات تأثير معنوي في نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار وكانت العلاقة طردية إي أن زيادة الأملاح تؤدي إلى زيادة تركيز الكلوروفيل في الورقة يدعم ذلك عدم معنوية المركبة التريية إذ إن نسبة الكلوروفيل

أخذت □ الازدیاد ضمن حدود الدراسة وهو ما یوجب إجراء دراسات على نسبة الأملاح أكثر من (4.5) الحد الأعلى المستعمل في رسالتنا.

أظهر تحليل الانحدار الآتي :

7- إن المعادلة الخطية غير جديرة □ تمثیل العلاقة □ بين العوامل الثلاثة الداخلة في التجربة (الشاي الأخضر , المدة الزمنية للتنقيع والتركيز الملح) ونسبة الكلوروفيل

وان المعادلة الخطية التي تفترض إن الثبات يساوي صفر هي الأجدر □ تحليل □ بين العوامل الثلاثة التوضيحية والاستجابة □ يدعم ذلك قيمة احتمال رفض فرضية العدم وهي صحيحة فضلا عن معامل التوضيح R^2 التي ارتفع من (11.84%) إلى (88.18%) يدعم ذلك أيضا طبيعة المعادلة التي تتضمن الحد الثبات إذ أنها لا تتفق مع الواقع .

8- أظهرت المعادلات الخطية لتقدير العلاقة □ بين كل عامل □ شكل منفرد مع الاستجابة □ وجود نقص في دقة تحليل هذه المعادلة

لتقدير العلاقة □ بين كل عامل □ شكل منفرد ومتغير الاستجابة

□ بينما كانت المعادلة

هي الأجدر □ تمثیل هذه العلاقات وقد أعطت المعادلة التقديرية لتمثیل (العلاقة □ بين الأملاح ونسبة الكلوروفيل أعلى معامل توضيح 85.7% □ بينما أعطت المعادلة التقديرية لتمثیل العلاقة □ بين المدة الزمنية للتنقيع ونسبة الكلوروفيل معامل توضيح 72.11% □ وأعطت المعادلة التقديرية لتمثیل العلاقة □ بين الشاي الأخضر ونسب الكلوروفيل أقل معامل توضيح (37.68%)

كما هو واضح في متن الرسالة عن طريق مقارنة احتمال رفض فرضية العدم وهي صحيحة للمعادلات الثلاثة .

9- كما أظهر التحليل الإحصائي أن لإضافة المدة الزمنية للمعادلة التي تر □ بين التراكيز الملحية ونسبة الكلوروفيل معنوية عالية لكن لا تضيف للمعادلة قوة تفسير إضافية .

- 1- إقامة تجارب أخرى تحت الظروف نفسها يكون فيها مستوى الشاي الأخضر (0.01) والمدة الزمنية (12) ساعة والتراكيز الملحية (4.5) وأكثر .
 - 2- إجراء تجارب نباتية أخرى تحت المستوى الأول للشاي الأخضر(0.1) تراكيز ملحية مشابهة للحدود الدراسة.
 - 3- إشارة إلى الجهات المعنية إلى الاستفادة من نتائج تطبيق هذه التجربة لزيادة الإنتاج الزراعي .
 - 4- ضرورة إن يتم استخدام الأساليب الإحصائية في تحليل نتائج التجارب الزراعية .
 - 5- إقامة تجارب جديدة مستويات أعلى من التركيز الملحي المستعمل في الدراسة لأن التحليل الإحصائي قد اثبت إن المركبة الخطية ذات تأثير معنوي بينما لم يكن للمعادلة الترتيبية تأثير معنوي ضمن حدود الدراسة ما يعني أن نقطة النهاية العظمى لنسبة الكلوروفيل لم تنزل خارج حدود الدراسة .
- بينما كانت النهاية العظمى لنسبة الكلوروفيل تحت تأثير المدة الزمنية للتنقيع ونسبة الشاي الأخضر ضمن حدود الدراسة .

المصادر



القرآن الكريم

المصادر العربية

1. الأمام , محمد محمد الطاهر , " تصميم وتحليل التجارب " , الرياض , دار المريخ للنشر, (1994).
2. البراهيم, فوزية محمد و المنعم, ثروت محمد عبد , "تصميم وتحليل التجارب باستخدام برنامج " SPSS, كلية العلوم بالدمام – قسم الرياضيات, (2005).
3. التميمي, زهرة حسن والسعدون , فوزية غالب والثعلبي ,ساهرة حسين , "تحليل □ نحدار" مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ,جامعة البصرة 2014
4. الحمداني , خالد عبد الله سهر , المحمدي , عقيل نجم عبود ,مصلح عمر هاشم, " تأثير مستويات مختلفة من السماد النيتروجيني ومسافات الزراعة في صفات النمو والحاصل لنبات الباذنجان " , مجلة □ نبار للعلوم الزراعية , المجلد4 , العدد1, (2006).
5. الراوي , خاشع محمود وخلف الله , عبد العزيز خالد محمد, " تصميم وتحليل التجارب الزراعية " , الطبعة الثانية , جامعة الموصل , مديرية دار الكتب للطباعة والنشر, (1980).
6. الشيخلي, رواء نوري حسين , "العلاقة بين جدول تحليل تباين □ نحدار وجدول تحليل تباين التجارب العملية الكاملة " رسالة ماجستير في علوم الإحصاء مقدمة إلى كلية الإدارة و□ اقتصاد, جامعة كربلاء (2017).
7. الصحاف ,فاضل حسين و المحارب ,محمد زيدان خلف ,والسعدي ,فراس محمد جواد, "استجابة بعض هجن من الخيار إلى الأسمدة الكيماوية والعضوية " مجلة العلوم الزراعية العراقية 42_ (4):52_ 62 , (2011)
8. المشهداني , محمود حسن و المشهداني , كمال علوان خلف, " تصميم وتحليل التجارب " , الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة , جامعة بغداد, (2002).
9. المشهداني , كمال علوان خلف, " تصميم وتحليل التجارب باستخدام الحاسوب " , جامعة بغداد , الدار الجامعية للنشر, (2010).
10. جعفر , حيدر صادق, "تأثير عدة تراكيز ورشات متعددة من السماد البوتاسي (For Max) في نمو وحاصل نبات الباذنجان Solanum melongena L. المزروع داخل البيوت

- البلاستيكية", مجلة الكوفة للعلوم الزراعية, المجلد 4, العدد 1, الصفحة [195-186], (2012).
- 11.** حماد, حميد صالح و محمد, ضياء عبد و عبيد, عبد الرحيم عاصي, "تأثير ملوحة مياه الري ومغذاتها والنقع بحامض □ سكوربيك والمستخلص البحري (OLIGO-X) في إنبات ونمو بادرات بذور هجين الخيار DALIA الخاص بالزراعة المحمية", مجلة ديالى للعلوم الزراعية (2) : 213 – 222, (2013).
- 12.** دبذوب, مروان عبد العزيز والعبادي, محمود محمد طاهر, "مقارنة بعض طرائق معالجة النقص في الوحدات التجريبية اللازمة لتطبيق التجارب العاملة", المجلة العراقية للعلوم □ حصائية, المجلد 20, الصفحة [183-163], (2011).
- 13.** علوان, خضير عباس و الركابي, فاخر محمد و حسون, وفاء هادي, "دور بعض المستخلصات النباتية في تزهير الخيار في البيوت البلاستيكية", مجلة العلوم الزراعية العراقية-41(1):111-120, (2010).
- 14.** محمد, فراس احمد وخلف كمال علوان, "حساب مجاميع المربعات لأجزاء (مركبات) SSe غي التجارب العاملة 2^n ذات □ دماج الكلي بطريقة مقترحة", مجلة العلوم □ اقتصادية و □ دارية, المجلد 15, العدد 53, الصفحة [199 -188], (2009).

المصادر الاجنبية

- 15.** Brzeskwiniewicz H., "Application of partially balanced block designs to factorial experiments", Biom. Journal, vol. 35, No. 7, pp. [833-847], (1993).
- 16.** Cochran W. G. and Cox, "Experimental Design"; Wiley; New York; USA, (1957).
- 17.** dean, a. m. & lewis, s. m., "A Comparison of Upper Bounds for Efficiency Factors of Block Designs", Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), Vol. 46, No. 2, pp. [279-283], (1984).

18. Dossou, S. and Tinsson, W., "Factorial experimental designs and generalized linear models", SORT 29 (2) July-December, 249-268, (2005).
19. Draper N.R. & Smith H., "Applied Regression analysis" 2nd Edition, John Wiley & son, New York, (1981).
20. Kirk, R. E., "Experimental design", Procedures for the behavioral sciences (3rd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, (1995).
21. Lie, C.C., "Introduction to Experimental Statistics", John Wiley, (1944).
22. Mahajan S. ; Tuteja N., Cold, salinity and drought stresses. Archives of Biochemistry and Biophysics ,444 :139–158, (2005).
23. Montgomery , Douglas C. , (2005) , " Design And Analysis of Experiments " , 6th Edition , John Wiley & son , new york .
24. Myers R. H., " Response Surface Methodology Allyn and Bacon. Boston, (1971).
25. Oyeyemi, G.M "Treatment of non normal responses from designed experiments", department of statistics university of Iorin-nigeria jnsa 17, 8-19, (2004).
26. Oyeyemi , G. M. & Ibraheem , B. A. & Obafemi , O. S. & Ige , S. O., "Analyzing factorial experiment involving qualitative and quantitative factors" , AJST Journal , vol. 10 , No. 1, (2009).
27. Rayner , A. , " The Square summing check on the main effects and interactions in a 2^n factorial experiment as calculated by Yates' algorithm " , Biometrics , vol. 23 , No. 3 , p. 571 (1967)
28. saha, g. m. and das, m. n., "Construction of Partially Balanced Incomplete Block Designs through 2^n Factorials and Some New

Designs of Two Associate Classes", journal of combinatorial theory, vol. 11, pp. [282-295], (1971).

29.Searle, S. R., "Linear models", John Wiley and sons, New York, (1971).

30.Sonneveld C, Voogt SJ., Effects of saline irrigation water on glasshouse cucumbers. Plant Soil, 49 (3): 595 – 606, (1978).

31.Touchette B.W.; Smith G.A.; Rhodes K.L.; and Poole M..Tolerance and avoidance: two contrasting physiological responses to salt stress in mature marsh halophytes *Juncus Roemerianus* scheele and *Spartina Alterniflora* loisel. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 380 :106–112, (2009).

32.Wilk, M. B. and Kempthorne O., "Some Aspects of the Analysis of Factorial Experiments in a Completely Randomized Design", The Annals of Mathematical Statistics, vol. 27, No. 4, pp. [950-985], (1956).

33.Yetes, F., "Design Analysis of Factorial Experiment", Imprial of soil sciences harpenden engeland , vol. 35 , pp.77, (1937).

مواقع □ نترنت

34.<https://onlinecourses.science.psu.edu/stat501/node/270>

الملاحق



الملحق (1) نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار

C5			C4			C3			C2			C1			المدة الزمنية	الشاي الأخضر
49.9	46.1	58.6	55.3	55.9	49.4	32.8	44.5	43.7	39.7	41.3	37.2	38.8	28.6	39.9	B1	A1
54.2	55.7	52.6	52	45.7	49.7	55.9	52.3	58.2	47.7	50.6	38	34.7	34.9	31.5	B2	
43.4	44.4	54.5	55.4	57.1	52.1	66.1	56.6	42.6	62.5	52.7	52.5	44.9	45.4	53.3	B3	
50.9	44.3	36.7	54.2	36.1	44.3	59	62	57.4	37.9	61.2	39.8	51.6	46.3	41	B4	
52.3	46.1	58.6	55.3	55.9	49.4	32.8	44.5	43.7	39.7	41.3	37.2	38.8	28.6	39.9	B1	A2
66.6	63.2	59.9	59.1	57.1	60.8	60.4	57.4	58.9	64.4	64.1	64.8	56.8	53.4	58.6	B2	
67	56.8	61.5	58.7	60.2	65.8	53.4	64.9	63.3	54.1	52.8	61.5	62.1	62.1	65.9	B3	
55	51.3	51.7	41.9	41.9	41.9	50.7	65.7	59.5	62.2	51.3	62.3	44.2	65.4	55.9	B4	
52.3	46.1	58.6	55.3	55.9	49.4	32.8	44.5	43.7	39.7	41.3	37.2	38.8	39.3	39.9	B1	A3
62.4	50.2	55.6	60.1	49.6	50.2	54.8	49.2	43.7	68.3	61	64.6	59.5	45.6	67.7	B2	
57	54.2	51.4	52.8	45	48.3	37.8	43.4	36.1	43.2	37.1	49.3	62.2	54.9	58.5	B3	
48.6	55.2	48.3	48.3	53.1	49.9	44.1	45.3	37.2	45.9	46.6	49.6	61.8	44.9	53.3	B4	

الملحق (2) نسبة الكلوروفيل في ورقة نبات الخيار

y	x1 level	x2 level	x3 level	y	x1 level	x2 level	x3 level	y	x1 level	x2 level	x3 level
39.9	0.1	0	0	39.9	0.01	0	0	39.9	0.001	0	0
28.6	0.1	0	0	28.6	0.01	0	0	39.3	0.001	0	0
38.8	0.1	0	0	38.8	0.01	0	0	38.8	0.001	0	0
37.2	0.1	0	0	37.2	0.01	0	0	37.2	0.001	0	0
41.3	0.1	0	0	41.3	0.01	0	0	41.3	0.001	0	0
39.7	0.1	0	0	39.7	0.01	0	0	39.7	0.001	0	0
43.7	0.1	0	0	43.7	0.01	0	0	43.7	0.001	0	0
44.5	0.1	0	0	44.5	0.01	0	0	44.5	0.001	0	0
32.8	0.1	0	0	32.8	0.01	0	0	32.8	0.001	0	0
49.4	0.1	0	0	49.4	0.01	0	0	49.4	0.001	0	0
55.9	0.1	0	0	55.9	0.01	0	0	55.9	0.001	0	0
55.3	0.1	0	0	55.3	0.01	0	0	55.3	0.001	0	0
58.6	0.1	0	1.5	58.6	0.01	0	1.5	58.6	0.001	0	1.5
46.1	0.1	0	1.5	46.1	0.01	0	1.5	46.1	0.001	0	1.5
49.9	0.1	0	1.5	52.3	0.01	0	1.5	52.3	0.001	0	1.5
31.5	0.1	6	1.5	58.6	0.01	6	1.5	67.7	0.001	6	1.5
34.9	0.1	6	1.5	53.4	0.01	6	1.5	45.6	0.001	6	1.5
34.7	0.1	6	1.5	56.8	0.01	6	1.5	59.5	0.001	6	1.5
38	0.1	6	1.5	64.8	0.01	6	1.5	64.6	0.001	6	1.5
50.6	0.1	6	1.5	64.1	0.01	6	1.5	61	0.001	6	1.5
47.7	0.1	6	1.5	64.4	0.01	6	1.5	68.3	0.001	6	1.5
58.2	0.1	6	1.5	58.9	0.01	6	1.5	43.7	0.001	6	1.5
52.3	0.1	6	1.5	57.4	0.01	6	1.5	49.2	0.001	6	1.5
55.9	0.1	6	1.5	60.4	0.01	6	1.5	54.8	0.001	6	1.5
49.7	0.1	6	2.5	60.8	0.01	6	2.5	50.2	0.001	6	2.5
45.7	0.1	6	2.5	57.1	0.01	6	2.5	49.6	0.001	6	2.5
52	0.1	6	2.5	59.1	0.01	6	2.5	60.1	0.001	6	2.5
52.6	0.1	6	2.5	59.9	0.01	6	2.5	55.6	0.001	6	2.5
55.7	0.1	6	2.5	63.2	0.01	6	2.5	50.2	0.001	6	2.5
54.15	0.1	6	2.5	66.6	0.01	6	2.5	62.4	0.001	6	2.5
53.3	0.1	12	2.5	65.9	0.01	12	2.5	58.5	0.001	12	2.5
45.4	0.1	12	2.5	62.1	0.01	12	2.5	54.9	0.001	12	2.5
44.9	0.1	12	2.5	62.1	0.01	12	2.5	62.2	0.001	12	2.5
52.5	0.1	12	2.5	61.5	0.01	12	2.5	49.3	0.001	12	2.5
52.7	0.1	12	2.5	52.8	0.01	12	2.5	37.1	0.001	12	2.5
62.5	0.1	12	2.5	54.1	0.01	12	2.5	43.2	0.001	12	2.5
42.6	0.1	12	3.5	63.3	0.01	12	3.5	36.1	0.001	12	3.5
56.6	0.1	12	3.5	64.9	0.01	12	3.5	43.4	0.001	12	3.5

66.1	0.1	12	3.5	53.4	0.01	12	3.5	37.8	0.001	12	3.5
52.1	0.1	12	3.5	65.8	0.01	12	3.5	48.3	0.001	12	3.5
57.1	0.1	12	3.5	60.2	0.01	12	3.5	45	0.001	12	3.5
55.4	0.1	12	3.5	58.7	0.01	12	3.5	52.8	0.001	12	3.5
54.5	0.1	12	3.5	61.5	0.01	12	3.5	51.4	0.001	12	3.5
44.4	0.1	12	3.5	56.8	0.01	12	3.5	54.2	0.001	12	3.5
43.4	0.1	12	3.5	67	0.01	12	3.5	57	0.001	12	3.5
41	0.1	24	3.5	55.9	0.01	24	3.5	53.3	0.001	24	3.5
46.3	0.1	24	3.5	65.4	0.01	24	3.5	44.9	0.001	24	3.5
51.6	0.1	24	3.5	44.2	0.01	24	3.5	61.8	0.001	24	3.5
39.8	0.1	24	4.5	62.3	0.01	24	4.5	49.6	0.001	24	4.5
61.2	0.1	24	4.5	51.3	0.01	24	4.5	46.6	0.001	24	4.5
37.9	0.1	24	4.5	62.2	0.01	24	4.5	45.9	0.001	24	4.5
57.4	0.1	24	4.5	59.5	0.01	24	4.5	37.2	0.001	24	4.5
62	0.1	24	4.5	65.7	0.01	24	4.5	45.3	0.001	24	4.5
59	0.1	24	4.5	50.7	0.01	24	4.5	44.1	0.001	24	4.5
44.3	0.1	24	4.5	41.9	0.01	24	4.5	49.9	0.001	24	4.5
36.1	0.1	24	4.5	41.9	0.01	24	4.5	53.1	0.001	24	4.5
54.2	0.1	24	4.5	41.9	0.01	24	4.5	48.3	0.001	24	4.5
36.7	0.1	24	4.5	51.7	0.01	24	4.5	48.3	0.001	24	4.5
44.3	0.1	24	4.5	51.3	0.01	24	4.5	55.2	0.001	24	4.5
50.09	0.1	24	4.5	55	0.01	24	4.5	48.6	0.001	24	4.5



Abstract

Agricultural experiments play a major role for agricultural workers in terms of experimentation and analysis in order to reach the most important factors affecting plant productivity.

The study aimed to know the effect of green tea extract on cucumber production by sowing cucumber seeds for different periods in different saline concentrations and different concentrations of green tea solution before germination.

The experiment was carried out according to the complete random design (CRD) of a completely factorial experiment of type (5 * 4 * 3 * 3).

Theoretically, the laboratory experiments were fully studied in the framework of the complete design and the statistical methods used in the study. The global experience, trend analysis and regression analysis.

To achieve the objectives of the study, data of responses were recorded from experiments conducted at the University of Babylon - Faculty of Science in the Department of Botany for global experiments in laboratory conditions consisting of three factors. The first factor was green tea containing three levels (0.1, 0.01, 0.001). The second is the length of time for planting the seeds in the green tea extract and has four levels (0, 6, 12, 24) and the third factor salt concentration at five levels (0, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5)

After testing the normality distribution of the data, the variance was analyzed and the main effects of factors were calculated. The results of the

study showed that the extract of green tea had a significant effect on chlorophyll concentration in cucumber leaves. The best level of tea was the second level (0.01) which gave the best response and the third period of time (12) hours gave the best effect on the response. The fourth salinity concentration (4.5) dsm/m were the best effect on the chlorophyll ratio in the cucumber paper.

According to the results obtained from the variance analysis table the relationship between the treatments and the response is estimated. Linear equations for estimating the relationship between individual factors indicate that the accuracy of linear equation representation is not appropriate to estimate the relationship between each individual factor and the response. The linear equation, which assumes that the constant is zero, is the best to represent these relationships. The estimated equation for the relationship between salts and chlorophyll has a higher coefficient of determination, followed by a period for sterilization followed by green tea. We could not calculate the best concentration of salts because the quadratic contrast of the salts was not significant



*Republic of Iraq
Ministry of Higher Education and Scientific Research
University of Karbala
Faculty of Administration and Economics
Department of Statistics*

Using some statistical methods to study the effect of green tea to reduce salt stress in cucumber

**A thesis Submitted to
Council of the Faculty of Management and Economics at
the University of Karbala As part of the requirements for a
Master's Degree in Statistics Science**

**By
Marwa Haidar Ghazi**

Under Supervised

**Prof. Dr. Awad Kadhem AL-khaledi
Altman**

Supervisor

Dr. Wassen Mudar Abu